『東醫寶鑑』膏劑에 대한 연구

원광대학교 한의학전문대학원[1]·한의과대학 원전학교실[2]·
한국전통의학연구소[3]·원광대학교 익산한방병원[4]
홍윤정[1]·송지청[1, 2]·이시형[1, 3, 4]·금경수[1, 2, 3]*

A Study of Paste Preparations in『Dongeuibogam』

Hong Yun-jung[1, 2, 3]·Song Ji-chung[1, 2]·Lee Si-hyeoung[1, 3, 4]·Keum Kyung-soo[1, 3]*
[1]Prof. Graduate School of Oriental Medicine, Wonkwang University
[2]Dept. of Classics, College of Oriental Medicine, Wonkwang University
[3]Research Center of Traditional Korean Medicine
[4]Iksan Oriental Medical Hospital, Wonkwang Univ.

Objectives : The study contains formulas, medicinal herbs, how to make of paste preparations in『Dongeuibogam』.

Methods : I will try to find paste preparations in 『Dongeuibogam』 using a word, paste(膏).

Results : Paste preparations are categorized into two types: the external and the internal medicine. Paste preparations were used not only in the dermatology disease but in the internal disease. The same formula name to have different information was written by other people. Various kinds of medicinal herbs, minerals, animals were used and type of oil or juice was used to dissolve these. Methods to process paste preparations were to grind medicines or extract from medicinal materials. Paste preparations for the external was used to put in eyes or to push into wound and apply them to the skin. Paste preparations for the internal was used to take with wine, water and herbal tea. Some paste preparations were used both external and internal.

Conclusion : These results explain that Paste preparations were variously used in『Dongeuibogam』.

Key Words : Paste preparations, paste(膏), 『Dongeuibogam』

Ⅰ. 서 론

한방에서는 주로 구강을 통한 內服藥의 투여와 鍼灸治療가 시행되고 있는데, 최근에는 약침요법, 훈증요법, 향기요법 등 다양한 방법이 시도되고 있다.

한약의 劑型에는 湯, 膏, 丸, 散, 丹, 酒 등이 있으며 內服과 外用에 두루 쓰이고 있다. 외용약은 단순히 외과 질환에만 국한되어 사용된 것이 아니고 내과 질환에도 쓰인다. 外用藥 중에서 膏劑는 자주 사용하고 중요하게 쓰이는 제형이다. 膏劑는 상온에서 고체, 반고체 혹은 반유체 상태의 제품으로 크게 內服膏와 外用膏로 나눈다. 內服膏는 통상 膏滋라 하며 장기간 저장하여 복용하며 흔히 만성질환 혹은 신체 허약자에게 보양하기 위해 쓴다. 外用膏는 膏藥과 藥膏로 구분하는데, 膏藥은 배지가 부착된 외점고제의 일종

* 교신저자 : 금경수. 전북 익산시 신용동 344-2
원광대학교 한의학과 원전학교실
E-mail: kskeum@wku.ac.kr Tel : 063-850-6847.
Fax : 063-842-4328.
접수일(2011년 2월 23일), 수정일(2011년 2월 23일)
게재확정일(2011년 3월 21일)

www.kci.go.kr

이고, 藥膏는 흔히 軟膏라 하는데 적당한 기초제와 혼합하여 만들며 피부에 직접적으로 작용하게 한다.[1)]

근래에 들어서는 한약의 다변화를 위해 새롭게 농축제, 주사제 등의 신제제가 개발되고 있으나 일반인들이 가장 많이 알고 있고 선호하며 효과가 가장 높을 것으로 생각하는 한약 劑型이 모두 湯劑라는 연구결과[2)]와 같이 선호도가 湯劑에 편중되어 있는 실정이다.

그렇지만 吳尙先은 『理淪騈文』에서 膏는 동시에 서로 다른 부위에 붙일 수 있어 서로 다른 효과를 한꺼번에 볼 수 있으며, 제조는 번거롭지만 대량으로 제조하여 장기간 보관할 수 있고, 적은 양으로도 효과적인 치료가 가능하므로 상당히 경제적이라고 하였다.[3)] 비록 임상에서 膏劑에 대한 선호도는 낮다 하더라도 劑型의 다양화 측면에서 충분히 연구할 필요가 있다고 생각한다.

지금까지 外用膏에 관련된 연구들은 외치요법에 어떤 종류가 있는지를 고찰한 연구[4)]와 外治療法의 시대적 고찰에 대한 연구[5)]들이 있었으며, 內服膏에 관련된 연구로는 특정질환에 적용시킨 임상연구[6)]가 있을 뿐 內服膏에 관련된 문헌연구는 없는 실정이다. 그리고 외용고에 대한 문헌고찰 연구라 하더라도 주로 중국의서를 연구대상으로 하였기 때문에 우리나라의 外治療法에 대한 연구는 미비한 실정이다. 따라서 우리나라에서는 어떻게 膏劑를 사용했는지 알아보기 위해 『東醫寶鑑』을 대상으로 膏劑와 관련된 내용을 조사하였다. 『東醫寶鑑』은 조선시대 의서이기는 하지만 당시까지 처방과 이론을 종합 정리해 놓은 의서이며, 여기에 수록된 처방은 현재까지 널리 사용하고 있다. 『東醫寶鑑』에 나오는 膏劑 관련 내용을 처방, 주치병증, 구성약재, 제조방법, 사용법, 출전별로 고찰해 보고자 한다.

Ⅱ. 연 구 방 법

① 법인문화사가 2007년도 출판한『新對譯 東醫寶鑑』을 대상으로 조사하였다.

② 원문 전체에서 膏자가 들어간 문장을 선택하여 정리하였다.

③ 膏粱飮食, 穴이름(膏肓輸 등), 기름(脂)과 같은 의미로 쓰인 문장은 제외하였다.

④ 처방명이 膏로 되어 있는 것과 처방명은 없지만 膏형태로 되어 있는 경우를 선택하여 정리하였다.

⑤ 선택된 처방을 外用으로 쓰인 膏劑와 內服으로 쓰인 膏劑로 나누어 정리하였다.

⑥ 선택된 처방을 처방명, 병증, 약재, 만드는 방법, 사용법, 출전 등으로 정리하였다.

⑦ 同一 처방명이지만 출전에 따라 처방내용이 다른 경우는 출전을 처방명 앞에 함께 써서 구별하였다.

⑧ 처방명과 출전이 같지만 구성약재가 다른 경우는 처방명 뒤에 번호를 부여하여 표기하였다.

⑨ 처방명이 없는 경우에는 본초명을 가지고 명명하고 처방명 뒤에 ✶로 표기하였다.

---

1) 신민교. 임상본초학. 서울:영림사. 2002. pp. 119~120.
2) 박유선. 한약건강보험 개선을 위한 한방의료기관의 한약사용 실태조사 -한약제형을 중심으로. 경희대학교 대학원. 한방응용의학. 2008.
3) 정명용 외3인. 理淪騈文의 학술사상에 관한 연구(1). 한국의사학회지. 제18권 1호. 2005. pp.73~78. 내용 요약.
4) 특정 요법에 관한 연구로는 ① 이진아 외2인. 點眼藥에 대한 문헌적 고찰. 한방안이비인후피부과학회지 제6권 1호. 1993. ② 이병욱 외4인. 千金要方에 기재된 藥浴療法에 관한 연구. 대한한의학원전학회지 제17권 1호. 2004. ③ 신상문 외1인. 外科疾患에 상용하는 膏藥의 처방내용에 대한 고찰. 대한안이비인후피부과학회지. 제7권 1호. 1994. 등이 있다.
5) 외치요법에 대한 史的 고찰로는 ① 박태열 외1인. 馬王堆醫書, 黃帝內經, 金匱要略에 나타난 중국 고대 外治療法. 동의생리병리학회지 제16권 4호. 2002. ② 문우상 외2인. 魏晉시대의 外治療法에 관한 연구. 대한한의학원전학회지. 제18권 3호. 2005. ③ 문우상 외3인. 外治療法의 이론과 적응증에 대한 사적 고찰. 한국한의학연구원논문집. 제10권 2호. 2004. 등이 있다.
6) ① 이은숙, 서부일, 이준우, 배진승. 瓊玉膏 및 瓊玉膏 加味方이 폐암에 미치는 영향. 대한본초학회지. 제17권 2호. 2002. ② 오철, 김호현, 고흥. 청공고의 내피세포 의존성 혈관이완효과. 동의생리병리학회지. 제22권 3호. 2008. ③ 최영철, 오태환, 정승기, 이형구. 윤폐고 및 자소반하탕가미방의 효능에 관한 실험적 연구. 경희대학교 한의과대학 논문집. 제15권 1호. 2007.

www.kci.go.kr

Ⅲ. 본 론

1. 外用膏

1) 洪寶膏

治衄血不止 取藥冷水 調塗後 頂上最絶血路(方見回春)[7]

治一切腫毒 散血消膿 天花粉三兩 白芷 赤芍藥 各二兩 鬱金一兩 右爲末 茶調塗患處 乾則換新[回春][8]

2) 天南星草烏膏✶

痰塊 宜開氣消痰湯 又天南星草烏等分爲末 薑汁調如膏 敷核上 立消[醫鑑][9]

3) 貼臍膏

治大小便不通 甘遂爲末 麪調作糊 貼臍中 及臍下 硬處 別煎甘草湯 服之 以通爲度[類聚][10]

治小便癃閉不通 宜貼臍膏(方見大便) 通關散[11]

4) 納臍膏

治噤口痢 危重者 用之立愈 王爪藤連莖葉經霜者 晒乾 燒灰 香油調納臍中 卽效[醫鑑][12]

5) 廻生神膏

治陰證 大小便不通 數日危急者 用之 非急 勿用牡蠣 陳粉 乾薑炮 各一兩 右爲細末 男病 用女人唾 調手內擦熱 緊掩二卵上 得汗出愈 女病 用男子唾 調手內擦熱 緊掩二乳上 得汗出愈 盖卵與乳 乃男女之根蔕 坎离之分屬也[海藏][13]

6) 回春蝸牛膏

治大小便不通 蝸牛三枚 連殼擣爲泥 加麝香少許 貼臍中 以手揉按之 立通 無蝸牛 則用田螺歷 試殊效[回春][14]

7) 入門蝸牛膏

治痔瘡腫脹 作熱如火 蝸牛一箇 入片腦 麝香 各少許 同入瓦器內盛 頓半日 自化成水 取塗痔上 痛止 腫消 立愈[得效] ○一名 蝸牛膏 用法同上[入門][15]

8) 硫黃膏

治面上生瘡 或鼻臉赤紫 及風刺粉刺 諸藥不效 生硫黃 白芷 瓜蔞根 膩粉 各半錢 全蝎三箇 蟬殼五枚 莞靑七枚去翅足 右爲末 另以香油 黃蠟 和合 如面油 法火上熔熱取下 乃入藥末 在內和勻 每用少許 臨臥洗面後 塗面上 勿近眼 數日赤自消 風刺粉刺一夕 見效[得效][16]

9) 玉容膏

一名 玉容西施膏 塗燥瘡 黃芪 當歸 白芷 川芎 藿香 零陵香白 檀香 香附子 白斂 白芍藥 白芨 杏仁 各一兩 瓜蔞一箇 龍腦二錢 淸油四斤 黃蠟一斤 右除龍腦 並剉浸油中 春五夏三秋七冬十日 日滿 於石器煎 候白芷焦黃色 乃去滓 入蠟熔化 又去滓 入龍腦 攪勻密封 用之 冬則蠟減半[袖珍][17]

治面上燥瘡 及斑黶諸刺(方見雜方)[18]

10) 玉容西施膏(袖珍玉容膏)

一名 玉容西施膏 塗燥瘡 黃芪 當歸 白芷 川芎 藿香 零陵香白 檀香 香附子 白斂 白芍藥 白芨 杏仁 各一兩 瓜蔞一箇

---

7) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.307.
8) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1494.
9) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.378.
10) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.558.
11) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.494.
12) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.537.
13) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.558.
14) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.559.
15) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.915.
16) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.598.
17) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1635.
18) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.599.

www.kci.go.kr

龍腦二錢 淸油四斤 黃蠟一斤 右除龍腦 並剉浸油中 春五夏三秋七冬十日 日滿 於石器煎 候白芷焦黃色 乃去滓 入蠟熔化 又去滓 入龍腦 攪勻密封 用之 冬則蠟減半[袖珍][19]

11) 磨瞖膏

消瞖膜 葵仁口含去皮殼一兩 片腦三錢 空靑二錢 右合於乳鉢內 硏極細盛盒內 旋取少虛 點眼中[得效][20]

白瞖旋遶 瞳人點點如花 白鱗砌者 此因肝肺伏藏積熱 宜點磨瞖膏 後服羚羊角散[得效][21]

黑珠上 浮玉色 不疼痛 瞖根不紅不宜針割 但服還睛散 點磨瞖膏 卽愈[得效][22]

凡瞖自下生上者 爲順 自上而生下者 爲逆 順則易安 逆則難治 宜服車前散 點磨瞖膏[得效][23]

空靑 法木 故色靑而入肝 主靑盲明目 去瞖膜瞳人破者 再得見物其殼 入磨瞖膏 神效[本草][24]

12) 花草膏

眼胞皮肉 有似膠凝腫高 如桃李 時出熱淚 乃風毒所注 宜服消風散(方見頭部) 點花草膏[25][得效][26]

13) 三光膏

治犯土傷眼 朱砂 雄黃 鵬砂 各等分 右細末 乳汁調塗 盛椀內 覆地上 以艾葉燒烟熏之 至黃色爲度 帶椀收貯 用時以香油少許 調勻點眼角[醫鑑][27]

犯土傷眼痛 點三光膏[醫鑑][28]

14) 地黃膏

治眼被物 撞打腫痛 昏暗 生地黃一合 取汁黃連一兩 黃栢 寒水石 各五錢 右三味爲末 和地黃汁 成餠以紙攤貼眼上 非但撞打 凡風熱赤目熱淚出 皆可用[得效][29]

目被撞打疼痛 無時瞳人被驚 昏暗濛濛 眼眶停留瘀血 宜貼地黃膏 次服石決明散[得效][30]

宜服石決明散 救苦湯 以洗眼湯洗之 以五黃膏 地黃膏貼之效[丹心][31]

此證輕則無妨 重則疼痛而白睛紅花 乃生瞖膜 此由五藏積熱 宜貼地黃膏 次服瀉肝散[得效][32]

湯火傷 眼腫痛 不可用冷藥 點之以五行湯 溫洗地黃膏付之(方見上)[入門][33]

15) 地黃大黃膏✶

若生瞖障 生地黃汁 和大黃末 成膏 帛鋪二寸許 奄眼上 久則易之[得效][34]

16) 五黃膏

治目赤腫痛 黃栢一兩 黃連 黃芩 黃丹 大黃 各五錢 右爲末 每一錢 蜜水調成膏 攤緋絹上 隨左右貼太陽穴 乾則以溫水 潤之[御藥][35]

---

19) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1635.
20) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.641.
21) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.618
22) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.618.
23) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.618.
24) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.646.
25) 花草膏 처방 내용은 『東醫寶鑑』에 수록되어 있지 않은데, 『得效』에는 "治患眼腫痛澀癢 昏淚羞明 羯羊膽 一枚 飯上蒸熟 上以冬蜜硏和 入朱砂末少許 頻硏成膏 食後臨臥 匙抄少許含咽 亦可點目."이라고 하였다. 危亦林. 世醫得效方. 중국중의약출판사.1996. p.277.
26) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.618.
27) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.642.
28) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.620
29) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.627.
30) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.620
31) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.621.
32) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.621.
33) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.634.
34) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.620.
35) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.628.

www.kci.go.kr

宜服石決明散 救苦湯 以洗眼湯 洗之 以五黃膏 地黃膏 貼之效[丹心][36]

17) 醫林龍腦膏

治小兒胎風 赤爛 龍腦一錢 蕤仁泥二錢半 杏仁七箇爲泥 右入人乳 硏爲膏 點之[醫林][37]

小兒初生 便有此證 至三四歲 雙目紅而弦邊赤爛時 復痒痛 先服消風散(方見頭部) 以湯泡散洗之 以龍腦膏點之[得效][38]

18) 寶鑑龍腦膏

治同上(卒聾) 龍腦一分 椒目五錢 杏仁泥二錢半 右爲末 和捻棗核大 綿裹塞耳 日二易[寶鑑][39]

19) 局方春雪膏

治目赤腫痛 淚出眥爛 蕤仁去殼皮硏壓去油二兩 龍腦二錢半 生蜜六錢 右硏勻以銅 筯蘸少許點之 治爛弦風 歲久連眶赤爛者 最效[局方][40]

20) 得效春雪膏

治眼目赤腫 生醫障 鵬砂三錢 龍腦一錢 朴硝五錢 右合硏極細 每用少許 點口中津液 沾入眼中 閉瞼時方 開眼淚出效[得效][41]

瞼中紅赤而堅硬 眼睛疼痛而淚出 怕日羞明 宜通肝散 若有醫障 點春雪膏[得效][42]

傷寒熱病後 目昏或生醫膜 宜服石決明散(方見上) 點春雪膏(方見下)[43]

21) 百點膏

治醫膜 黃連二錢 剉水一椀 煎至半 入防風八分 當歸身 甘草 各六分 蕤仁泥三分 右剉同熬 滴水中不散 絞去滓 入煉蜜少許 再熬少時 令靜心點之 日五七次 臨臥點 尤疾效 有人病醫 六年 以至瞳人 覆雲氣之狀 用此藥而得效[東垣][44]

眼中有膜 自上垂下 遮黑睛 名垂簾膜 望風淚出 怕日羞明 此客邪上衝 用百點膏點之 次服通肝散[得效][45]

22) 南星地黃膏✶

治偸鍼生南星 生地黃 同硏成膏 貼兩太陽穴 腫自消[綱目][46]

23) 五膽膏

治眼昏常見黑花 欲成內障 靑羊膽一枚 黃牛膽汁一合 熊膽二錢半 鯉魚膽七錢半 烏鷄膽五枚 牛黃五錢 右爲末 先將諸膽相和 次入牛黃末 攪勻銀石器內 慢火熬成膏 食後溫酒調下半錢 仍將少許點眼中[類聚][47]

治眼昏 常見黑花 欲成內障(方見上)[48]

24) 點醫膏

治醫膜 朱砂水飛二錢 鵬砂一錢半 蕤仁二十一粒 爲泥 眞珠爛 石膏 各半錢 熊膽二分半 麝香一分 右爲細末 用好蜜硏和於銚內 蒸得粘磁器 收貯 用秦皮煎湯 調少許以銅筯 蘸點 眥頭淚出爲效[直指][49]

25) 蕤仁膏

去醫障 如神蕤仁泥一兩 鵬砂一錢二分 龍腦五分 熊膽三錢 右爲末 入生蜜四兩 調勻盛磁罐 取少許 點之[入門][50]

---

36) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.621.
37) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.642.
38) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.621.
39) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.663.
40) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.641.
41) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.641.
42) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.622.
43) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.635
44) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.642.
45) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.622.
46) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.623.
47) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.634.
48) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.643.
49) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.642.
50) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.642.

www.kci.go.kr

26) 明鏡膏

治眼目昏花 努肉雲翳腫痛 神效 黃丹水飛一兩 官粉 乳香 硇砂 各五分 鵬砂 銅綠 各三分 沒藥二分 右爲末 煉蜜入水 些少調藥 令勻燒 艾葉熏之 以香油少許 調勻點眼 此神方也[醫鑑][51]

27) 二百味花草膏

治火眼及爛弦風 痒痛流淚 羯羊膽一枚 以蜜滿灌入 朱砂末少許 掛起陰乾 每取一粒 水和點眼 以蜜採百花 羊食百草 故以爲名也[入門][52]

28) 楓膏

治爛弦赤腫流淚 楓葉多取濃煎汁去滓 熬成膏 取以點眼 又楓葉細切 和燒酒蒸絞取汁 點眼 亦效[俗方][53]

29) 猪膽龍腦膏✶

治外障瞖 猪膽一枚 銀石器煎成膏 入龍腦少許 點眼中 仍取猪膽 白皮 曝乾 撚作繩釵 股大燒一頭 作灰 冷點瞖上 三五度差[得效][54]

30) 蒲黃膏

治耳卒聾 細辛 蒲黃 各五錢 杏仁 神麯 各七錢半 右爲末 杏仁膏 和捻如棗核大綿裹 塞耳日一易[寶鑑][55]

31) 細辛膏

治鼻塞腦 冷淸涕不止 細辛 川椒 乾薑 川芎 吳茱萸 附子 各七錢半 皂角屑五錢 桂心一兩 猪油六兩 右煎猪油成膏 先一宿以苦酒浸 前藥取入油煎 附子黃色止 以綿裹塞鼻孔中[入門][56]

51) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.642.
52) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. pp.642~643.
53) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.643.
54) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.651.
55) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.663.
56) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.669.

32) 辛夷膏

治鼻中瘜肉 窒塞疼痛 辛夷二兩 細辛 木通 木香 白芷 杏仁 各五錢 右以羊髓猪脂二兩 和藥于石器內 慢火熬成膏 取赤黃色 放冷入龍腦 麝香 各一錢 爲丸 綿裹塞鼻中 數日脫落 卽愈[御院] ○小兒鼻流淸涕 取此貼顖門上 又塗鼻中[丹心][57]

33) 雄黃定痛膏

治牙痛 大蒜二枚 細辛 焰硝 各三錢 雄黃一錢 猪牙皂角 四錠 右爲末 蒜膏擣爲丸 梧子大 每一丸 將綿子裹藥 左邊牙疼放在左耳中 右邊塞右耳良久痛止神效[綱目][58]

34) 禦寒膏

治體虛人 背上惡寒 或夏月怕脫衣 及婦人産後 被風冷手足冷痛至骨 又治腰痛 生薑半斤 取自然汁 入明膠三兩 乳香 沒藥 各一錢半 銅杓內煎 化移在滾湯內 頓以柳條 攪至成膏 又入川椒末少許 再攪勻用皮紙 攤貼患處 用鞋底烘熱熨之 候五七日脫下 或起小瘡 不妨[醫鑑][59]

35) 丹參膏

治乳癰結核刺痛 及潰後不斂 丹參 赤芍藥 白芷 各等分 剉酒淹二宿 入猪脂半斤 煎令白芷焦黃 則膏成矣 去滓 入黃蠟一兩 攪勻候凝每取少許 塗之[入門][60]

36) 入門如聖膏

治難産 及死胎不下 十分危急者 巴豆十六箇去殼 草麻子四十九粒去殼 麝香二錢 同搗如泥 攤絹上帛 貼臍上一時 産下卽洗去[入門][61]

産後瘀血 上攻忽兩乳伸長 細小如腸直 過小腹痛 不可忍 名曰乳懸 危證也 川芎 當歸 各一斤 濃煎湯 不時溫服

57) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.672.
58) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.698.
59) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.731.
60) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.764.
61) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1665.

www.kci.go.kr

再用二斤 逐旋燒烟安在病人面前卓子下 令病人曲身 低頭將口鼻 及病乳常吸烟氣 未甚縮 再用一料 猶不復舊 則用如聖膏 貼頂上(方見婦人)[入門][62]

兒之初生 惡血流入衣中 衣爲血所脹塞 故不能下 須臾衝上逼心 卽死 急服奪命丹 貼如聖膏(方見上)[63]

産後陰戶突出 四物湯(方見血門) 加龍骨(無則用五倍子) 連用二貼 外以香油和湯 洗患處 且取如聖膏(方見上) 貼頂上[入門][64]

37) 得效如聖膏1

一方 萆麻子去皮一兩 雄黃二錢 同硏成膏 塗母右脚心 纔産速 洗去否 則腸出 用此膏 塗頂上腸 自入 亦名如聖膏[得效][65]

盤腸産 謂孕婦臥産時 子腸先出 兒卽隨産 治法頂上貼如聖膏(方見下)[66]

38) 得效如聖膏2

歌曰 紫癜 白癜 兩般風 附子 硫黃 最有功 薑汁調勻 茄蒂 蘸擦來兩度 更無蹤 ○右附子 硫黃 等分爲末 以茄蒂 蘸醋點藥末 擦之 紫癜用紫茄 白癜用白茄[得效][67]

39) 丹溪如聖膏

歌曰 紫癜 白癜 兩般風 ..... 丹溪方 用白附子[68]

40) 代灸塗臍膏

治下元虛寒 臍腹冷痛 大附子 馬藺子 蛇床子 木香 肉桂 吳茱萸 各等分 右爲末 入白麵薑汁 調成膏 作片 貼臍上以帛包繫[醫林][69]

寒痛 宜厚朴溫中湯 桂香散 溫胃湯(方見胸部) 沈香磨脾散 酒煮當歸丸(方見胞門) 代灸塗臍膏(方見臍部) 玉抱肚[70]

治痼冷 臍腹痛 附子 馬藺子 蛇床子 吳茱萸 肉桂 木香 右細末 用白麪一匙 薑汁 調成膏 攤紙上圓三寸許 貼臍下關元氣海 自晩至曉 其力可代灸百壯[海藏][71]

41) 代灸膏

貼腰眼穴(方見寒門)[72]

42) 丹心琥珀膏

治同上(積塊) 大黃 朴硝 各一兩爲末 大蒜 搗爲膏 和勻作片 貼之[丹心] ○一方 加麝香五分 名硝黃膏[入門][73]

肝火盛 兩脇痛 不得伸 舒先以琥珀膏(方見積聚) 貼痛處 却以生薑湯 呑下蜜丸 當歸龍薈丸(方見五藏) 最妙 此藥蜜丸 乃治脇痛[丹心][74]

左脇痛 先以琥珀膏 貼痛處(方見積聚) 却以當歸龍薈丸 熱薑汁呑下[入門][75]

43) 局方琥珀膏

琥珀一兩 丁香 木香 各七錢半 木通 桂心 當歸 白芷 防風 松脂 朱砂 木鱉子 各五錢 麻油一斤 右除琥珀 丁香 木香 桂心 朱砂 爲末 外其餘並剉浸油三宿 慢火煎攪 候白芷焦黃色 漉出次下 松脂熔化 濾去滓 再熬下黃丹一斤 以柳篦不住 手攪令黑色 滴水中成珠 乃入琥珀 等五末 攪勻候 凝作片 聽用[局方][76]

---

62) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.766.
63) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1667.
64) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1681.
65) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1665.
66) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1661.
67) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.807.
68) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.807. 得效如聖膏2에서는 부자를 쓴 것과는 달리 白附子를 썼다.
69) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.780.
70) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.770.
71) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1140.
72) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.786.
73) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1368.
74) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.791.
75) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.794.

www.kci.go.kr

瘰癧惡瘡 …… 初起未破 十香膏 琥珀膏(二方見雜方) 常貼之 可自消[精義][77]

44) 硝黃膏(入門琥珀膏)

一方 加麝香五分 名硝黃膏[入門][78]

45) 蜘蛛輕粉膏★

大蜘蛛一箇 鹽泥作一窠 包裹蜘蛛煆紅 放冷取蜘蛛硏細 入輕粉一字 醋調成膏 夕付腋下 明日登厠 必瀉下黑汁 臭穢於僻 處埋之[三因][79]

46) 爐灰膏

點黑痣 卽去 最妙 用響糖爐內 灰一升半 風化石灰一升 炒紅以竹箕盛貯 用滾湯三椀 慢慢淋 自然汁一椀 鍋盛慢火 熬如稀糊 先下巴豆末 次下蟾酥各二錢 白丁香末五分 炒 石灰末一錢 攪勻再熬如乾麪糊 取起竢 冷磁罐盛貯 勿令泄氣 每用時以簪頭 挑少許 放指甲上硏 呵口氣 調勻如泥 將患處用鍼撥開 以藥點之卽效[入門][80]

治一切惡瘡 除去瘀肉 最妙(方見雜方)[81]

臁瘡 …… 內外通用爐灰膏(方見雜方) 點去瘀肉後貼 黃蠟膏[入門][82]

治癰疽惡瘡 內點去瘀肉 最妙 用響糖爐內灰(無則桑柴灰代之)一升半 風化石灰一升炒紅 以箕子盛貯 用滾湯三椀 慢慢淋自然汁一椀許 銅鍋盛慢火 熬如稀糊 先下巴豆末 次下蟾酥各二錢 白丁香末五分 石灰炒一錢 攪勻再熬如乾麪糊 取起候 冷磁罐盛貯 勿令泄氣 每用時以簪頭 挑少許放指甲上 硏呵氣 調勻如泥 用鍼撥開患處 以藥點之 勿點好肉 及眼上[入門][83]

47) 金絲膏

金絲膏 主風濕 筋寒諸病 可外貼之(方見丹心)[84]

48) 得效黃蠟膏

治冬月 手足皸裂 作痛 淸油五錢 慢火煎沸 入黃蠟一塊 再煎候熔 入胡粉 五倍子末 各少許 熬令紫色爲度 先以熱湯 洗患處 火上烘乾 用藥付上以紙貼之 其痛立止 入水亦不落[得效][85]

49) 入門黃蠟膏

治內外臁瘡 香油一兩 入油髮如梅大 熬消化 入白膠香三錢 黃蠟一兩 熔化入龍骨 赤石脂 血竭末 各三錢 攪勻 候冷 盛磁器 每用捏作薄片 貼瘡上 絹帛縛定 三日後 翻過貼之[入門][86]

臁瘡 …… 內外通用 爐灰膏(方見雜方) 點去瘀肉後 貼黃蠟膏[入門][87]

50) 俗方黃蠟膏

治諸瘡 能生肌 香油 黃蠟 松脂 各等分 右熔化 待凝貼之 加油髮灰 尤妙[俗方][88]

凡治惡瘡 令生肌 宜用生肌散 翠霞散 黃蠟膏(三方見上)[入門][89]

痛甚者 內服乳香定痛散(方見上) 隨以熱酒盡量而飮 外貼 黃蠟膏(方見諸瘡) 有血瘀壅腫 先刺出惡血 然後乃貼膏藥[入門][90]

---

76) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1634.
77) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1542.
78) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1368.
79) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.795.
80) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.807.
81) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1569.
82) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1559.
83) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1636.
84) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.830.
85) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.842.
86) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1560.
87) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1559.
88) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1570.
89) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1570.
90) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1585.

www.kci.go.kr

51) 綱目三聖膏

治髭髮脫落 能令再生 附子 蔓荊子 柏子仁 各五錢 右爲末 烏鷄脂 和勻檮乾 置瓦合內封固 百日取出 塗落處 三五日 卽生新髮[綱目][91]

52) 入門三聖膏

貼積塊風化 石灰半斤爲末 瓦器炒 令淡紅色 提出 候熱稍減 次下大黃末一兩 就爐外炒 候熱減 入桂心末五錢略炒 入米醋 熬成黑膏 厚紙攤開 貼患處[入門][92]

53) 外染烏雲膏

五倍子製五錢 銅末製二錢 白礬 白鹽 各一錢半 沒石子二箇 麪炒黃色 右爲末 濃茶調重湯煮 見黑色 如上法 用卽黑[種杏][93]

54) 藜蘆膏

治諸努肉 如菌突出 藜蘆爲末 猪脂調和塗之 一日一易 努肉自入[入門][94]

55) 秘傳神應膏

治痔漏如神 片腦 熊膽 血竭 牛黃 乳香 沒藥 各五分 右爲末 蝸牛取肉 擣成稀膏 每夜洗淨拭乾 將此膏 搽上患處 數遍卽愈 宜磁罐收貯 不要乾了[回春][95]

56) 辰砂膏

痔漏塞竅 信砒一錢 白礬二錢 密陀僧 辰砂 各五錢 右先研 信砒細鋪鍋底 次用礬末 鋪砒上火煆烟盡爲度 次將陀僧 辰砂研細 白糕 和勻作尖挺子如小麥 大取一粒 納漏孔內 去敗肉盡後 貼生肌散[丹心][96]

57) 入門熊氷膏

治五十年久痔 及一切諸痔 痔漏 脫肛腫痛 絶勝他藥 熊膽二分半 片腦半分 研勻 白雄鷄膽三箇 取汁 調勻 以鷄羽蘸塗痔上 先以藥水洗淨 乃上藥神效[入門][97]

58) 綱目熊氷膏

又方治諸痔 雄鷄膽 片腦研勻 塗之[綱目][98]

59) 熊膽膏(得效熊氷膏)

一方熊膽片腦 各少許 井水研調塗痔上 名曰熊膽膏[得效][99]

60) 痔藥膏子

治外痔 及反花痔 脫肛腫痛 濃水不止 柴灰淋濃 汁兩椀 熬至一椀 却入草烏片 大黃片 各二錢 慢火熬至半椀 入甘草一錢 數沸 下淨石灰末半匙 略沸三五次 用絹兩重 濾過 再熬成膏 候冷 入膽礬五分 研極細 瓦器盛貯臨 用入龍腦末少許 和勻以銀篦 蘸藥塗付 日一次重者 三五次 先以藥水洗 乾乃塗之 神效[綱目][100]

61) 種杏田螺膏

治痔瘡 腫痛 坐臥不得 諸藥不效 惟此極妙一點卽好 大田螺八九箇 鍼破 頂盖入白礬末少許 置地上尖底埋土中 其頂盖仰天 經一宿 次日取 盖上水汁 以鷄羽 塗痔上 五七次卽消[種杏][101]

---

91) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.867.
92) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1368.
93) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.868.
94) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.892.
95) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.907.
96) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.908.
97) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.914.
98) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.914.
99) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.914.
100) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.915.
101) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.915.

www.kci.go.kr

62) 丹心田螺膏

治痔瘻 田螺一箇 挑開靨 入片腦少許 過一宿 先以冬瓜煎湯 洗後 取藥塗之[丹心][102]

63) 皂角膏✶

欲吐風涎 取皂角 以漿水浸 春秋四日 夏二日 冬七日 揉去渣熬爲膏 攤紙上陰乾 用時以水化開灌入鼻內 良久涎出爲效 若吐多欲止之 飮溫鹽湯 一二口卽止[入門][103]

64) 天仙膏

治卒中風 口眼喎斜 南星大者一箇 草烏大者一箇 白芨二錢 白殭蠶七箇 右爲末 生鱔魚血 調成膏 付喎處 覺正便洗去[得效][104]

65) 水調膏

治破傷風 發熱紅腫 風邪欲傳 經絡而未深入者 杏仁硏爲泥 白麪等分 新汲水 調成膏 塗傷腫處 卽腫消熱退 神驗[醫鑑][105]

66) 禦風膏

治中風 口眼喎斜 取子去殼 擣爛 右喎塗左 左喎塗右 ○一方硏塗在 手心以一盂子置在手心 萆麻子 上用熟水 置盂中 候口眼正 則急去之 左右如上法 用[本草]名禦風膏[106]

67) 五仙膏

治一切痞塊 積聚 癖疾 大黃 皂角 生薑 生葱 大蒜 各半斤 右共搗爛 水煎取汁去楂 再熬成膏黑色爲度 攤縝帛上 先以鍼刺患處後 貼膏藥[回春][107]

68) 貼痞膏

水紅花子二錢 大黃 朴硝 山梔 石灰 各一錢 酒酵一塊 鷄子 大共搗成膏 用布攤開貼痞塊上 再用湯 瓶熨手帕勒之 三日後 揭起肉黑如墨 是其效也[入門][108]

69) 塗臍膏

治水腫 小便絶少 地龍生硏 猪苓 甘遂 鍼砂 各五錢 右爲末 擂葱涎調成膏 敷臍中約一寸 以絹帛束之 以小便多爲度 日兩易之[得效][109]

70) 外敷神膏

大黃 朴硝 各四兩 麝香一錢 爲末 每二兩 和大蒜 搗成膏 敷患處[入門][110]

71) 涌泉膏

治癰疽 軟而瘡頭不破 或已破而瘡頭腫結無膿者 斑猫去毒焙 右爲末 硏和蒜膏 如小豆許 點在膏藥中 准瘡口處 貼之 少頃膿出 卽去藥[直指][111]

72) 驢蹄蕎麥草烏膏✶

隔皮 取膿法 ○驢蹄肉焙 蕎麥粉炒 各一兩 白鹽五錢 草烏四錢 右爲末 水調作餠 慢火灸微黃色 去火毒爲末醋 調成膏 攤厚紙上貼患處 水自毛孔而出 其腫自退 諸般腫毒 皆效[入門][112]

73) 去水膏

癰疽破穴後 誤入諸毒水以致臀痛 砂糖 糯米粉 各七錢半 甘草生末二錢半 右入熟水少許爲膏 攤絹上貼之 毒水自出 驢馬汗及尿糞一切毒水 皆治之[直指][113]

---

102) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.915.
103) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1003.
104) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1034.
105) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1058.
106) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1063.
107) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1368
108) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1368.
109) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1380.
110) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1396.
111) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1489.
112) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1489.

www.kci.go.kr

74) 巴豆膏

巴豆去殼炒焦硏如膏 如發背中央肉死 塗之卽腐未死 塗之生肌惡瘡賺瘡 久不收斂 內有毒根 以紙撚蘸藥納之根去卽斂 如元氣虛弱 毒氣散 漫中央肉死 急服大補之劑中塗三四寸許 至五六日 赤黯之界 自裂紋如刀劃狀 中央漸潰 若脾胃大虛 肉不知痛急 補脾胃肉 多復生[入門][114]

75) 正傳神異膏

露蜂房 杏仁 各一兩 黃芪七錢半 蛇退鹽水洗淨 玄參 各五錢 亂髮 鷄子大 香油 十兩 黃丹五兩 右先將油 及髮銚中熬 候髮烊盡 入杏仁 候杏仁黑色 綿濾去滓 乃入黃芪 玄參 熬一二時 稍停 入蜂房 蛇退 攪熬至紫黑色 又濾去滓 慢火熬 下黃丹 急攪千餘轉 滴水不散膏卽成矣 磁器收貯 用治諸般癰癤毒[正傳][115]

癰疽 瘡口久不合 肉白而膿血少 乃氣血不潮于瘡 冷滯而然 陳艾葉濃煎取湯 逐日溫洗 仍以白膠香燒烟熏之 神異膏貼之(方見雜方)[精要][116]

治發背 癰疽 及諸般惡毒 瘡癤 貼之 其效如神 ○膏藥 甚多 效驗 無出于此(方見雜方)[117]

76) 得效神異膏

治同上(一切瘡疥) 全蝎七箇 皂角二錢 巴豆去皮七箇 蛇床子末三錢 雄黃另硏三錢 輕粉一字 淸油一兩 黃蠟半兩 右先用全蝎 皂角 巴豆 入油 煎變色 去三味 入蠟熔化放冷 入雄黃 蛇床 輕粉 和勻成膏 先以藥水 洗瘡拭乾後 乃上藥擦之神效[得效][118]

77) 乳香膏

治背瘡 初發赤腫而高 乳香一兩 靑薄荷葉四兩 右硏勻 罨患處 靑絹盖之 如乾新水潤之 令熱毒消散 減疼免牽引[涓子][119]

78) 水澄膏

治癰瘡 熱毒 腫痛 黃連 黃栢 白芨 白斂 各四錢 雄黃一錢 乳香 沒藥 各五分 右末水調鷄羽 掃上腫處[丹心][120]

79) 沈水膏

治癰疽 發背 排膿 斂毒 大南星七錢半 白芨 白芷 赤小豆 半夏 生貝母 各五錢 木鱉子仁 乳香 沒藥 各二錢半 雄黃一錢 右爲末 蜜水調付紗貼[直指][121]

80) 三神膏

治癰疽 發背 萆麻子去殼四十九枚 陳醋一椀半 鹽一撮 右同入鍋中熬之 槐枝 攪成膏 先以米泔 洗瘡 搽上留頂 未成膿 卽消已 成膿 卽出膿[醫鑑][122]

81) 萬應膏

大黃 黃芩 各二兩 白斂 黃蠟 各一兩 黃栢 芎藭 白芷 黃芪 木鱉子仁 杏仁 當歸 白芨 生地黃 官桂 玄參 沒藥 乳香 各五錢 黃丹一斤 香油二斤八兩 右十四味 剉浸油三宿 慢火熬以柳枝攪 以白芷焦黃色爲度 綿濾去滓 入黃丹 再熬滴水 成珠 乃入乳沒 蠟熔化 攪勻收貯盛器 埋土中 七日取出 攤用治一切癰腫久瘡[精義][123]

治一切瘡疽 初發焮腫 或老瘡不差 亦令收斂 早合貼之神效(方見雜方)[124]

82) 靈應膏

白麥飯石火煅醋淬十餘次硏 令極細 鹿角燒存性 白斂 並爲細末 右取石末 白斂末 各二兩 鹿角末四兩 並要極細 不細則反痛 取好米醋 入銀石器 煎令魚眼沸 却入三味藥末 竹

113) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1489.
114) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1491.
115) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1635.
116) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1493.
117) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1494.
118) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1553.
119) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1494.
120) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1494.
121) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1494.
122) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1494.
123) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. pp.1635.~1636.
124) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1494.

www.kci.go.kr

篦子 不住手攪熬 一二時 稀稠得所傾出 候冷 先以猪蹄湯或藥水洗 去膿血 挹乾鵝翎拂藥 塗四圍 凡赤處盡塗之 但留一口 如錢 大以出膿血 如藥乾以醋拂濕 初便一日洗 換十日後兩日一換 其效如神治癰疽 惡瘡 瘰癧 結核 乳癰[精要][125]

治五發 癰疽 惡瘡 瘰癧 結核 乳癰 貼之 則未成膿者 自消 已成膿者 便潰 惡肉易去 新肉早生 其效如神(方見雜方) ○一名 麥飯石膏[精要][126]

83) 麥飯石膏(精要靈應膏)

白麥飯石火煆醋淬十餘次硏 令極細 鹿角燒存性 白斂 並爲細末 右取石末 白斂末 各二兩 鹿角末四兩 並要極細 不細則反痛 取好米醋 入銀石器 煎令魚眼沸 却入三味藥末 竹篦子 不住手攪熬 一二時 稀稠得所傾出 候冷 先以猪蹄湯或藥水洗 去膿血 挹乾鵝翎拂藥 塗四圍 凡赤處盡塗之 但留一口 如錢 大以出膿血 如藥乾以醋拂濕 初便一日洗 換十日後兩日一換 其效如神治癰疽 惡瘡 瘰癧 結核 乳癰[精要][127]

治五發 癰疽 惡瘡 瘰癧 結核 乳癰 貼之 則未成膿者 自消 已成膿者 便潰 惡肉易去 新肉早生 其效如神(方見雜方) ○一名 麥飯石膏[精要][128]

84) 太乙膏

治五發 癰疽 一切惡瘡 及蛇虎犬蝎 幷湯火 刀斧 打撲損傷 可內服外貼 ○若作丸服之 則蛤粉爲衣 ○一名 神仙太乙膏(方見雜方)[129]

85) 神仙太乙膏(太乙膏)

玄參 白芷 當歸 肉桂 赤芍藥 大黃 生地黃 各一兩 剉浸 麻油二斤 春五 夏三 秋七 冬十日 慢火煎 令白芷焦黃色 去滓 下黃丹一斤 極攪勻 滴水中成珠 乃候凝 作片聽用[局方][130]

125) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1636.
126) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1495.
127) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1636.
128) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1495.
129) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1495.
130) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1634.

治五發 癰疽 一切惡瘡 及蛇虎犬蝎 幷湯火 刀斧 打撲損傷 可內服外貼 ○若作丸服之 則蛤粉爲衣 ○一名 神仙太乙膏(方見雜方)[131]

86) 雲母膏

雲母焰硝 甘草各四兩 槐枝 柳枝 陳皮 桑白皮 側栢葉 水銀 各二兩 川椒 白芷 沒藥 赤芍藥 肉桂 當歸 鹽花 黃芪 血竭 菖蒲 白芨 芎藭 木香 白斂 防風 厚朴 麝香 桔梗 柴胡 松脂 人參 黃芩 蒼朮 草龍膽 合歡 乳香 附子 茯苓 高良薑 各五錢 黃丹十四兩 淸油二斤半 右除雲母 焰硝 血竭 沒藥 乳香 麝香 黃丹 鹽花 外餘藥剉 浸油中 七日後 文火煎 候白芷 附子 焦黃色 以布絞去滓 再熬後 下黃丹等 八味 細末 以柳木篦 不住手 攪直至膏 凝滴水中 成珠爲度 傾在磁器內 彈水銀在上 每用刮去水銀 凡癰疽 瘡腫 外貼 內服 神效[局方][132]

治一切癰疽 惡瘡 腫毒 折傷 瘰癧 骨疽 內疽 乳癰 肺癰 腸癰 並可外貼內服(方見雜方) ○凡五發 及發背 外以敗蒲煎水 洗瘡貼之 又取一兩 作丸 梧子大 溫酒呑下三十丸 瘰癧 骨疽 亦如之 腸癰 作丸 甘草湯呑下 下膿血 卽愈 一切瘡疽 外貼立差 忌食羊血[局方][133]

87) 善應膏

黃丹八兩 白膠香 乳香 沒藥 並另硏當歸 白芷 杏仁 大黃 草烏 川烏 赤芍藥 檳榔 生乾地黃 川芎 瀝靑 另硏亂髮 各一兩 右香油一斤 浸藥三宿 慢火熬至黑色 再入葱白 亂髮煎 少時濾去滓 再上慢火熬却入黃丹 以柳篦 不住手攪滴水 成珠 不散乃入乳沒膠香十分 攪勻盛器沈水中 三日取出 聽用治諸般惡瘡腫毒及諸傷[得效][134]

治諸般腫毒 惡瘡 發背 腦疽 瘰癧 打撲 閃肭 金瘡 杖瘡 蛇虫 犬馬 咬疥 癬等疾 並外貼 內服 ○內疽肺癰 腸癰 作丸 如上法服(方見雜方)[135]

131) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1495.
132) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1635.
133) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1495.
134) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1636.
135) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1495.

www.kci.go.kr

88) 入門糯米膏

淨糯米三升 入磁盆內 於端午前 四十九日 以冷水浸之 一日兩度 換水 勿令米碎 至端午日 取出用絹袋盛之 風乾 每旋取少許 炒黑爲末 冷水調成膏 量瘡大小貼之 絹帛包定直 侯瘡愈爲度 乾則換 常令濕爲妙[入門][136]

89) 綱目糯米膏

治撲傷 筋斷 骨折 糯米一升 皂角切碎半升 銅錢百箇 同炒至焦黑 去錢 右爲末 酒調膏 貼患處 神效[綱目][137]

90) 蟾蜍膏

治附骨疽 久不差 膿汁敗壞 或骨從瘡口出 大蝦蟆一枚 亂髮 鷄子大 猪脂 四兩 右以猪脂 煎二物 令稠去滓 凝如膏貼之 先以桑白皮 烏豆煎湯 淋洗瘡口 拭乾然後 却貼之[得效][138]

初起 宜漏蘆飮子 五香連翹湯(方見上) 疎下之 次用內消升麻湯 在尻臀 宜內托羌活湯(方見上)在腿內 羌活防己湯 在腿外 托裏黃芪湯 黃連消毒飮(方見上) 潰後久不愈 宜蟾蜍膏 赤朮元平肌散[入門][139]

91) 大蒜膏✶

癰疽灸法 ○若十數頭作一處 生者卽用大蒜 硏成膏 作薄餠 鋪頭上 聚艾于餠上 灸之[三因][140]

灸疔疽法 ○大蒜爛搗成膏 塗瘡四圍 留瘡頂 以艾炷灸之 以爆爲度 不爆難愈 灸百壯無不愈[正傳][141]

92) 陶潛膏

治癰毒 及疔腫 垂死 菊葉搗取汁飮一升 神驗 ○又取莖葉 塗付疔上 亦效 名曰陶潛膏[醫鑑][142]

136) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1495.
137) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1582.
138) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1506.
139) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1505.
140) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1520.
141) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1521.
142) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1522.

93) 玉脂膏

治同上(治鵝掌癬) 牛乳 柏油(無則鵝脂代之) 香油 黃蠟 各一兩 熔化 乃入胡粉二錢 輕粉一錢半 麝香五分 右爲末 入內攪勻 抹癬上 火上烘擦 再烘再擦如神[醫鑑][143]

94) 蟾酥膏

蟾酥如大豆許 白丁香十五枚 巴豆肉五粒 寒水石 寒食麪 各少許 右各另硏 合和再硏 蜜丸菉豆大 每一丸 或二丸三丸 納入鍼竅中 如膿未盡 再納數丸 以膿盡爲度[正傳][144]

95) 綠雲膏

黃連 大黃 黃芩 玄參 黃栢 木鱉子肉 各一錢 右剉 香油一兩同煎 焦色去滓 入松脂五兩 再煎成膏 濾入水中 扯拔如金色 再熬放溫入猪膽三箇汁 銅綠醋浸一宿 去滓三錢 攪勻如常 攤貼如瘡口不乾 加乳香 沒藥 輕粉 尤妙[正傳][145]

96) 金寶膏

去腐肉 惡肉 不傷良肉 桑柴灰五椀 以沸湯十椀 淋濾取汁 穿山甲煨二兩 信砒一錢 杏仁七枚 三味同硏細 生地黃二兩 朱砂一錢 輕粉 麝香 各半錢 右將灰汁 下鍋煎 濃下甲末等 及地黃汁 候焦乾 下麝香 次下輕粉 次下朱砂 候將成膏 下炒石灰末一兩 以成塊子 收入罐內 勿見風 每取付核上 再付 卽去 舊藥幷醫卽效[正傳][146]

97) 十香膏

沈香 丁香 白檀 甘松 鬱金 各五錢 剉入 麻油一斤中浸七日 却入鐺內 慢火 養五日後 以文武火煎 二三十沸 用綿濾去滓 拭鐺下了煉油 入黃丹 以柳篦子 不住手攪 候色黑 滴水中 成珠然後 乃入乳香 木香 白膠香 龍齒 蘇合油末 各五錢 麝香末二錢半 攪勻三五百遍 候凝 作片 用時攤紅絹上貼之[聖惠][147]

143) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1537.
144) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1542.
145) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1542.
146) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1542.
147) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1634.

www.kci.go.kr

瘰癧惡瘡 …… 初起未破 十香膏 琥珀膏(二方見雜方) 常貼之 可自消[精義][148]

98) 化瘤膏

治肉中腫起生瘤 漸大 白斂一兩 大黃 川芎 赤芍藥 黃芩 黃連 當歸 白礬 各五錢 吳茱萸二錢半 右爲末 鷄子黃 調勻攤帛 貼之[類聚][149]

99) 得效南星膏

治癭瘤 生天南星大者一箇 細硏滴醋三五點爲膏 先將鍼刺瘤上 却以藥攤紙上貼之 頻貼取效 如無生者 乾者爲末 醋調用之[得效][150]

100) 醫鑑南星膏

南星膏加味方 南星膏 …… 又方南星 草烏爲末 薑汁調付之 亦佳[醫鑑][151]

101) 雄黃膏

治久年冷瘻 油髮灰 黃蠟 各五錢 雄黃末 硫黃末 各二錢半 香油二兩 右和勻熔火候 成膏貼之[直指][152]

102) 入門麻豆膏

通治諸癬 麻油二兩 入巴豆肉 草麻子肉 各十四粒 斑猫七粒 熬煎至枯黑色去滓 却入白蠟五錢 蘆薈末三錢 攪勻成膏 塗擦之[入門][153]

103) 丹心麻豆膏

遍身 生癬 獨莖 羊蹄狼 另搗白礬末 以米醋調成膏 塗擦之 加輕粉 黃丹 尤妙[丹心][154]

104) 蝎猫膏

治牛皮癬全蝎斑猫各十枚巴豆肉二十枚香油一兩右同熬候色焦者先去之去盡三物了乃入黃蠟一錢候熔收貯朝擦暮愈不損皮肉[綱目][155]

105) 神應膏

治白禿 頭瘡 羊糞燒存性 爲末 用鴈油調塗一次 卽愈[醫鑑][156]

106) 黃栢膏

一名 護眼膏 一名神應膏 黃栢一兩 甘草四兩 紅花二兩 菉豆粉一兩半 右爲末 淸油調從耳前 至于兩眼四畔厚 塗之[錢乙][157]

107) 護眼膏(黃栢膏)

一名 護眼膏 一名神應膏 黃栢一兩 甘草四兩 紅花二兩 菉豆粉一兩半 右爲末 淸油調從耳前 至于兩眼四畔厚 塗之[錢乙][158]

痘出太盛 恐入眼爲害 宜消毒飮 加酒炒芩連 外用護眼膏[入門][159]

眼腫突如桃者 貼護眼膏(方見上) 眼腫不開 黃連末 調鷄子淸 貼兩太陽穴 及兩足心[入門][160]

108) 如聖黑膏

治小兒白禿頭瘡 豆豉半升 草龍膽 蕪荑各二錢半 右燒存性爲末 香油半斤 熬至四兩 下藥調勻 付之 神效[得效][161]

---

148) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1542.
149) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1547.
150) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1548.
151) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1548.
152) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1550.
153) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1553.
154) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1553.
155) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1553.
156) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1556.
157) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1792.
158) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1792.
159) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1794.
160) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1794.
161) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1556.

www.kci.go.kr

109) 磨風膏

治陰蝕瘡 蛇床子五錢 大風子十四箇 杏仁二十箇 枯白礬 樟腦 各二錢 川椒 輕粉 水銀 各三錢 雄黃一錢半 銀硃一錢 右爲末 生麻油和丸 彈子大 每用少許 呵洋遍擦之[入門][162]

血風瘡 與腎臟風瘡 相類 乃三陰經風熱 鬱火血燥所致 瘙痒不常 膿水淋漓 潮熱盜汗 宜四物湯(方見血門) 加浮萍 黃芩 或當歸拈痛湯(方見足部) 外治 磨風膏(方見上) 大馬齒膏 塗之[入門][163]

110) 龍骨膏

治外廉瘡 龍骨 乳香 沒藥 密陀僧 各二錢 海螵蛸一錢半 皂角子五箇 燒存性 右爲末 用綿紙兩重 以鍼揷亂孔 香油調藥 夾內縛貼瘡上 隔日翻貼之[入門][164]

111) 馬齒膏

治廉瘡 馬齒莧煎取汁一釜 入黃蠟五兩 再熬成膏 塗之[入門][165]

112) 馬齒莧膏✶

馬齒莧 ○主小兒疳痢 煮熟和五味 空心食之 ○痘後瘢痕 及白禿瘡 馬齒汁 熬膏塗之 妙[本草][166]

113) 窯土膏

治外廉瘡 久年窯竈土 或竈心黃土 黃栢 赤石脂 黃丹 各五錢 輕粉 乳香 沒藥 各一錢 右爲末 香油 調成膏 先以茶清洗後 油紙攤藥貼之 以巾縛定縱痒不可忍 直待結痂去之 未愈 再貼[入門][167]

114) 神捷膏

治內外廉瘡 久年不愈 淸油半斤 先煎入黃蠟一兩 松脂五錢 熬至成珠 候冷 入乳香 沒藥 輕粉 血竭 孩兒茶 枯白礬 龍骨煆 各三錢 川椒四錢 右爲末 攪勻收貯 先以藥水洗淨 用油脂以鍼刺孔 攤藥貼瘡上二日 換三次二日 後一日換一次 每換藥必洗淨 貼上[醫鑑][168]

115) 翠玉膏

治廉瘡 瀝靑四兩 黃蠟銅綠 各五錢 沒藥三錢 右將香油半斤 同黃蠟 瀝靑 於火上熔化 次下銅綠 沒藥末 旋旋攪勻成稠 將藥傾冷水中 看瘡大小 捻作餅子貼之 以帛繫定三日一易[綱目][169]

116) 大馬齒膏

治兩足血風瘡 馬齒莧焙乾五錢 黃丹 黃栢 枯礬 孩兒茶 各三錢 輕粉一錢 右爲末 桐油 或麻油 調勻 攤油紙上 先以藥水淋洗 挹乾後 乃貼之[入門][170]

血風瘡 與腎臟風瘡 相類 …… 外治磨風膏(方見上) 大馬齒膏 塗之[入門][171]

117) 臘享膏

治凍瘡 猪脂 猯油 各二兩半 香油二合半 海松子油一合 松脂 黃蠟 各三兩 七錢半 右各煉去滓 和合成膏 先以藥水洗後 塗之[俗方][172]

治凍瘡 臘猪脂 猯油 各二兩半 香油二合半 海松子油一合 明松脂 黃蠟 各三兩七錢半 右各煉去滓 熔化成膏 待凝 貯器中 塗之[俗方][173]

---

162) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1558.
163) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1562.
164) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1560.
165) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1560.
166) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1802.
167) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1560.
168) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1561.
169) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1561.
170) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1563.
171) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1562.
172) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1564.
173) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1635.

www.kci.go.kr

凍瘡 雄雉 鷄腦 一枚 入黃蠟等分 淸油減半 熬膏 塗之[入門][174]

118) 柳枝葉膏✶

治翻花瘡 ..... 柳枝葉濃煎 作膏塗之[本草][175]

119) 大黃膏

治軟癤 大黃 黃栢 當歸 各等分 右爲末 以生地黃汁調 塗之[俗方][176]

120) 杏仁乳香硫黃膏✶

生手足間 相對如新茱萸痒痛 折裂有孔如蝸 久不愈 杏仁 乳香 各三錢 硫黃 輕粉 各一錢半 右爲末 麻油三錢 入黃蠟五錢 熔化入前藥末 攪煎成膏 塗之[入門][177]

121) 紫草膏

治熱毒瘡 紫草茸 黃連 黃栢 漏蘆 各五錢 赤小豆末 菉豆粉 各一合 右爲末 猪脂 或淸油 調日三付[直指][178]

122) 二黃膏

治一切惡瘡 淸油三兩煎 巴豆肉二十粒微黑色去豆 入黃蠟一兩熔化 又入硫黃 雄黃末 各一錢 和勻成膏 以藥水洗瘡 後擦付二三次 神效[得效][179]

123) 貝母膏

治諸惡瘡 貝母三錢半 半夏(生用) 南星(生用) 五倍子 白芷 黃栢 苦參 各二錢半 黃丹一錢半 雄黃一錢 右爲末 蜜水調付 或乾糝[直指][180]

124) 皂角子膏✶

諸瘡 入皂角水 及惡水熱痛不止 皂角子燒存性 硏二錢半 砂糖末五錢 和勻如膏 貼瘡上[本草][181]

125) 蛇含膏

蛇含草 ○主金瘡 搗付之佳 ○又云蛇含膏 連已斷之指[本草][182]

126) 將軍膏

治傷損腫痛 瘀血流注 紫黑 或傷眼上靑黑不散 大黃爲末 生薑汁 調付患處 卽消名將軍膏[醫鑑][183]

127) 醫鑑二生膏

治折傷手足 生地黃一斤 生薑四兩 右搗爛入酒糟一斤炒熱 布裹罨傷處 熨之 傷筋損骨痛 不可忍神效[醫鑑][184]

128) 得效二生膏

傷損臂臼脫 出腫痛 生地黃 搗爛 攤油紙上 次糝 木香末一層 又攤地黃 貼患處 明目痛 卽止[得效][185]

129) 種杏二生膏

治折傷 斷筋 損骨 生地黃 擣取汁 好酒和服 日二三次 最妙 又擣爛 蒸熱 封傷處一月 筋骨連續 蓋地黃 屬骨[種杏][186]

---

174) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1564.
175) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1566.
176) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1566.
177) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1567.
178) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1568.
179) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1569.
180) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1569.
181) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1570.
182) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1576.
183) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1579.
184) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1582.
185) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1582.
186) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1582.

www.kci.go.kr

130) 麻油豆豉膏✶

又生麻油 硏豆豉爲膏丸 如彈子大 常常揩拭 所咬處 却掐開 看豉丸內 若有狗毛茸茸然 此毒氣已出 揩至無茸 毛方乃痊可[十三方][187]

131) 萆麻子膏✶

萆麻子 ○主犬咬傷 取五十粒去殼 硏爲膏付之[綱目][188]

132) 救苦膏

治風濕痠疼 川烏炮三錢 牛膝 黃丹 乳香 另硏各五錢 白芷 貝母 白芨 白斂 各二錢 槐潤一錢(無則代桃膠) 沒藥另硏七錢 白膠香 另硏杏仁泥各三兩 當歸一兩 瀝靑另硏八兩 香油半盞 右末和勻 以香油澆潤火上熔化 每二兩 作一貼 攤油紙付患處[類聚][189]

133) 白龍膏

白薇 白芷 白斂 黃芪 商陸 根柳白皮 桑白皮 各一兩 輕粉五錢 另硏乳香二兩 另硏定粉黃蠟各八兩 杏仁油一斤(無則代香油) 右七味 剉浸三日 揉熬 令白芷黃色去滓 下黃蠟 乳香 令熔化出火 再濾微冷下 輕粉定粉 急攪至冷 收貯攤 緋帛上貼之 治諸般惡瘡 久瘡腫毒[精義][190]

134) 皂角草烏膏✶

小兒 初生 鼻塞不通 乳不得下 取猪牙 皂角 草烏 各等分 右爲末 葱涎調成膏 貼顚門上[191]

135) 桃仁五倍子白礬膏✶

桃仁 ○産後陰腫痛 桃仁細硏塗之 又和五倍子 枯白礬爲末 硏桃仁爲膏 塗之[正傳][192]

136) 五通膏

治臍風撮口 生地黃 生薑 葱白 蘿蔔子 田螺肉 右共搗爛 搭臍上四圍 一指厚 抱住下屁泄而愈[醫鑑][193]

137) 香螺膏

治臍風腫硬如盤 田螺三箇 入麝香少許 右搗爛 搭臍上 須臾 再易腫痛 立消[醫鑑][194]

138) 泥金膏

治丹毒熱瘭 無名腫毒 蚯蚓糞二分 焰硝一分 右新汲水 濃調敷上[回春][195]

139) 畫眉膏

山梔子炒黑三箇 雄黃 朱砂輕粉 各少許 爲末 淸油調勻 候兒睡着濃抹 畫兒兩眉上 醒來自不喫乳 未效 再畫仍用墨 搽乳頭[入門][196]

140) 百花膏

白蜜略用湯 和時時以鷄羽刷身上[正傳][197]

因食毒物 作痒 宜蟬退湯(方見上) 百花膏[正傳][198]

141) 硝膽膏

芒硝爲末 調猪膽汁塗之 無芒硝 則焰硝亦可[綱目][199]

痘瘡 煩痛 宜硝膽膏(方見下) 仍用眞黃土細末 糝之良[200]

---

187) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1588.
188) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1589.
189) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1634.
190) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1636.
191) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1700.
192) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1702.
193) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1716.
194) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1716.
195) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1760.
196) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1762.
197) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1786.
198) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1786.
199) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1787.

www.kci.go.kr

142) 臙脂膏

乾臙脂蜜調塗 兩眼眶 則痘不入眼[丹心][201]

痘出太盛 恐入眼爲害 宜消毒飮(方見上) 加酒炒芩連 桑白皮 草龍膽 煎服 外塗 臙脂膏 [入門][202]

143) 羊骨髓輕粉膏✶

痘落後 宜用滅瘢痕方 羊骨髓一兩煉一二沸 輕粉一錢 右硏如膏 每日塗瘡上 [綱目][203]

144) 必勝膏

馬齒莧 擣取汁 猪脂 白蜜 右等分 合和熬膏 塗之[正傳][204]

145) 芥子膏✶

芥子 ○治痘出不快 色不紅潤 宜內服 紫草飮(方見上) 外用芥子爲末 白湯調如膏 塗兒脚心乾 則再塗 卽快出紅活[入門][205]

146) 白油麻膏✶

白油麻 ○油-陳油 煎膏 生肌長肉 消癰腫 補皮裂[本草][206]

147) 鷹屎白膏✶

鷹屎白 ○性平(一云微寒) 有小毒 主滅瘢痕合 殭蚕衣 魚之類 爲膏塗之[本草][207]

148) 百鴿糞膏✶

白鴿糞 ○主頭極痒不痛 生瘡 醋調煮成膏 付之[本草][208]

149) 豹肉脂膏✶

豹肉 ○脂-可合生髮 膏朝塗暮生[本草][209]

150) 蟾蜍肪膏✶

蟾蜍 ○肪-塗玉 則刻之如蠟 但不可多得 但取肥者 剉煎膏 以塗玉亦軟[本草][210]

151) 鼴鼠膏✶

鼴鼠 ○膏堪摩諸惡瘡[本草][211]

152) 柳枝膏✶

柳枝 ○主齒痛 風熱腫痒 可作浴湯膏藥 牙齒病 爲最要之藥[本草][212]

153) 柳葉膏✶

柳葉 ○煎膏 續筋骨長肉 止牙痛[本草][213]

154) 白楊樹皮膏✶

白楊樹皮 ○性冷 味苦(一云酸) 無毒 主毒風 脚氣腫 去風痺 消撲損 瘀血作痛 療折傷 血瀝痛 煎膏可續筋骨[本草][214]

155) 黃丹膏✶

黃丹 ○性微寒(一云凉) 味辛 無毒 鎭心安神 主驚癎癲疾 除毒熱 驚悸狂走 療吐 逆反胃 止吐血 及嗽 治金瘡 及湯火瘡染鬚 可煎膏 止痛生肌[215]

---

200) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1786.
201) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1792.
202) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1792.
203) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1793.
204) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1796.
205) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1802.
206) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1838.
207) 상게서. p.1863.
208) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1865.
209) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1882.
210) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1908.
211) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1893.
212) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.2024.
213) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.2024.
214) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.2027.
215) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.2044.

www.kci.go.kr

156) 黃連甘草白芷膏✶

灸瘡久不合 黃連 甘草節 白芷 黃丹 香油 同煎膏貼之[丹心][216]

2. 內服膏

1) 入門瓊玉膏

塡精補髓 調眞養性 返老還童 補百損除百病 萬神俱足 五藏盈溢 髮白復黑 齒落更生 行如奔馬 日進數服 終日不飢渴 功效不可盡述 一料分五劑 可救癱瘓 五人一料 分十劑 可救勞瘵 十人若二十七歲服 起壽可至三百六十 若六十四歲服 起壽可至五百年 生地黃十六斤 搗絞取汁 人參細末二十四兩 白茯苓細末四十八兩 白蜜煉去滓十斤 右和勻 入磁缸內 以油紙五重厚布一重 緊封缸口 置銅鍋內 水中懸胎 令缸口出水上 以桑柴火 煮三晝夜 如鍋內水減 則用煖水添之 日滿取出 再用蠟紙緊封缸口 納井中浸一晝夜 取出再入舊湯內 煮一晝夜 以出水氣 乃取出先用少許 祭天地神祇 然後 每取一二匙 溫酒調服 不飮酒 白湯下 日進二三服 如遇夏熱 置陰凉處 或藏氷中 或埋地中 須於不聞鷄犬聲 幽淨處 不令婦人喪服人見之 製時終始勿犯鐵器 服時忌食葱蒜蘿葍醋酸等物[入門][217]

瓊玉膏 生精補氣(方見身形)[218]

勞瘵補虛 宜瓊玉膏 紫河車丸 凝神飮子[入門][219]

經曰 燥者潤之 養血之謂也 積液固能生氣 積氣亦能生液 宜服瓊玉膏(方見身形)[入門][220]

好色之人 元氣虛弱 咳嗽不愈 宜瓊玉膏(方見身形) 治虛勞乾咳嗽 最捷[丹心][221]

乾嗽 宜用瓊玉膏(方見身形) 潤肺散加味 二母丸 訶黎勒丸 抑痰丸(方見痰門)[222]

2) 衛生方瓊玉膏

衛生方 生地黃八斤 人參三十二兩 白茯苓二十四兩 白蜜五斤[223]

3) 益壽永眞膏[瓊玉膏]

本朝永樂中 太醫院會議 加天門冬 麥門冬 地骨皮 各八兩 進御服食 賜號益壽永眞膏[224]

4) 天門冬膏[225]✶

天門冬 ○ 久服輕身 延年不飢 取根去皮心 擣末 和酒服 或生擣絞汁 煎爲膏 和酒服一二匙 漢甘始太原人 服天門冬 在人間三百餘年[本草][226]

老來 髮落鬚長常也 少壯有髮落 或鬚亦落者 火炎血燥 故也 宜服地黃酒 天門冬膏(方竝見身形)[227]

治燥病 天門冬生去心 搗絞取汁 濾去滓 砂鍋熬成膏 酒服一二匙[正傳][228]

5) 枸杞子膏✶

金髓煎 取紅熟 枸杞子酒浸 兩月漉出研爛 以布濾去滓取汁 幷前浸藥酒 於銀石器內 熬成膏 每日溫酒下二大匙 日二次久服 可以羽化[本草][229]

---

216) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.2057.
217) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.220.
218) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.241.
219) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.475.
220) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1167.
221) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1308.
222) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1313.
223) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.220.
224) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.220.
225) 身形門에는 天門冬만 나와있고 天門冬膏라는 이름은 없으나 毛髮門에 나와있는 天門冬膏에서 處方은 身形에 있다고 했으므로 天門冬에 나와 있는 成膏의 內容은 天門冬膏를 의미한다고 볼수 있음. 따라서 燥門에 있는 天門冬膏도 같은 膏라고 봐야함.
226) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.224.
227) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.866.
228) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1168.
229) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.225.

www.kci.go.kr

6) 五味子膏★

五味子 益男子精[本草] ○五味子膏 澁精氣 治夢遺滑脫 五味子一斤 洗淨水浸一宿 挼取汁 去核 以布濾過入鍋內 入冬蜜二斤 慢火熬成膏 每取一二匙 空心白湯調服[本草][230]

7) 人參膏

治元氣虛乏 精神短少 言語不接 能回元氣於無何有之鄉 王道也 人參一斤切片 入砂鍋內 水浮藥一指 文武火煎 乾一半傾 在別處 又將渣如前煎三次 嚼參無味 乃止 却將前汁 入鍋內 熬成膏 日服五六匙 有肺火 與天門冬 對用甚妙[入門] ○人參 治脾肺陽氣不足 能補氣 促短氣少氣 非升麻爲引用 不能補上升之氣 升麻一分 人參三分 爲相得也 若補下焦元氣 瀉腎中火邪 茯苓爲之使[東垣] ○人參膏 獨參湯 須以長流水 煎服 乃有奇效[醫說][231]

人參 ○補五藏氣不足 又治氣弱氣短氣虛 或煎 或末 或熬膏 多服妙[232]

人參 補肺中陽氣 ○卒上氣喘鳴肩 息氣欲絶 此將肺絶之候 人參膏 獨參湯 或作末 日五六服[本草][233]

凡人目暴不見物 皆是氣脫 用人參膏(方見氣門) 以補之血藥 以行之[丹心][234]

急喉閉 其聲如鼾有如痰在喉響者 此爲肺絶之候 宜用人參膏救之 用薑汁竹瀝 放開頻頻服之 如未得人參膏 先煎獨參湯救之 早者十全七八 次則十全四五 遲則十不全一也[綱目][235]

虛勞證 咳嗽痰盛氣急 或唾血 此爲肺虛 宜用人參膏 獨參湯(二方見氣門) 人參黃芪散 團參飮子(方見咳嗽) 保和湯(方見下)[236]

人參 ○主肺虛氣短氣促咳嗽喘急 人參膏(方見氣門) 獨參湯(方見上) 皆有奇效[丹心][237]

8) 朱砂膏

驚熱至甚 昏迷不省 甘草七錢半 寒水石煆石膏煆各五錢 朱砂鵬砂焰硝各二錢半 龍腦一字 金箔銀箔各五片 右末 每二錢 麥門冬湯調下(得效)[238]

驚悸 當補血安神 宜靜神丹 寧志元 養血安神湯 朱砂膏 若氣鬱驚悸 宜交感丹(方見氣部) 加味四七湯[239]

婦人 宜加味逍遙散(方見婦人) 朱砂膏(見上)[240]

9) 局方寧志膏

治虛煩不得睡 或夢涉危險 睡臥不寧 酸棗仁炒二兩 人參一兩 朱砂五錢 乳香二錢半 右爲末 煉蜜和丸 彈子大 每一丸溫酒化下 大棗湯 亦可[局方][241]

癲狂不得睡臥 宜寧志膏(方見夢部) 辰砂散[諸方][242]

10) 大全良方寧志膏

婦人失血過多 心神不安 不得睡臥 朱砂酸棗仁炒人參白茯神琥珀各七錢半 乳香二錢 右爲末 每一錢 燈心 棗子煎湯調下[大全良方][243]

11) 一醉膏

治心恙癲狂 無灰酒二椀 眞麻油四兩 右和勻 以柳枝二十條 逐條攪一二百下 換遍柳條直候 油酒相入 如膏 煎至七分 椀强灌之 令熟睡 或吐 或不吐 覺來卽醒[得效][244]

---

230) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.242.
231) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.257.
232) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.264.
233) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.415.
234) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.635.
235) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.712.
236) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1253.
237) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. pp.1341.~1342.
238) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.278.
239) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.276.
240) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.284.
241) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.330
242) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.289.
243) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.330

www.kci.go.kr

因驚喪心亡魂失魄 爲癲狂 宜鎭心丹 抱膽丸 葉氏雄朱丸 一醉膏[諸方][245]

12) 玄霜膏

治咯血吐血 虛勞嗽 神效 烏梅汁梨汁柿霜白砂糖白蜜蘿蔔汁各四兩 生薑汁一兩 赤茯苓末八兩 用乳汁浸晒九次 款冬花紫菀末各二兩 共入砂鍋內熬成膏 丸如彈子大 每一丸 臨臥含化嚥下(入門)[246]

咳血者 咳甚出血 本於肺 龍腦鷄蘇丸鷄蘇散(方見上) 玄霜膏[247]

13) 玄霜雪梨膏

治咳嗽 唾咯 吐血 除勞心動火勞嗽 久不愈 雪梨六十箇 去心皮 取汁二十鍾 酸者不用 生藕汁十鍾 生地黃汁十鍾 麥門冬煎取汁五鍾 生蘿蔔汁五鍾 白茅根汁十鍾 右汁 合和重濾去渣 火上煎煉 入煉蜜一斤 飴糖八兩 柿霜八兩 薑汁半盞 火上再熬 如稀糊 則成膏矣 每服三五匙 日三服 不拘時[醫鑑][248]

治勞嗽久不愈 消痰止嗽 生津 止咯唾血 雪梨六十箇 去心皮 取汁二十鍾 酸者勿用 藕汁十鍾 生地黃汁十鍾 麥門冬煎取汁五鍾 生蘿蔔汁五鍾 茅根汁十鍾 右汁 重濾去滓 火上煎煉 入蜜十六兩 飴糖八兩 柿霜八兩 薑汁半盞 火上再熬 如稀糊則成膏矣 每服三五匙[醫鑑][249]

咳嗽 唾 咯血 宜龍腦鷄蘇丸 河間生地黃散 淸火滋陰湯 淸咳湯 淸咯湯 淸唾湯 坎离膏(方見下) 玄霜雪梨膏 恩袍散[250]

14) 坎离膏

治陰虛火動 致衄吐 咳嗽 咯唾血 黃栢知母 各四兩 生地黃 熟地黃 天門冬 麥門冬 各二兩 杏仁七錢 胡桃仁去皮淨 四兩 白蜜四兩 右先將黃栢知母 剉入童便三椀 側柏葉一把 煎至四椀 去渣 又將天麥門冬 生熟地黃 入汁內 添水二椀 再煎去滓 其滓再搗爛 如泥 另用水一二椀熬熟 絞汁入前汁 將杏桃仁擂爛 再濾去渣 同蜜入前汁 內熬成膏 磁罐收貯 封口沈水中 一日去火毒 每服三五匙 柏葉湯 調空心服 終始忌銅鐵器[回春][251]

咳嗽 唾 咯血 宜龍腦鷄蘇丸 河間生地黃散 淸火滋陰湯 淸咳湯 淸咯湯 淸唾湯 坎离膏(方見下) 玄霜雪梨膏 恩袍散[252]

治陰虛火動 潮熱盜汗 咯唾血欲成勞瘵疾 黃栢 知母 各四兩 生地黃 熟地黃 天門冬 麥門冬 各二兩 杏仁七錢 胡桃仁 蜂蜜 各四兩 右剉 先將黃栢知母 以童尿三椀 水三椀 側栢葉一杷 煎至三四椀 去滓 又將天麥門冬 生熟地黃 入汁內 添水二椀 煎汁去滓 再搗爛 如泥 另用水一二椀 煎熬 絞取汁 入前汁 將杏仁 胡桃仁 用水 擂爛濾汁 再擂再濾 至無滓同蜜入煎汁內 火熬成膏 入水內 去火毒 每服三五匙 以側栢葉湯 調空心服 忌銅鐵器[醫鑑][253]

15) 霞天膏

此方 卽倒倉古法 傳自西域異人 黃牯牛一具 選純黃肥澤 無病纔二三歲者 宰取四腿 項脊去筋膜 將精肉切成塊如栗子大 秤四五十斤 於靜室大鍋中 以長流水 不時攪動 水耗則旋添熱湯 常使水淹肉至五六寸 掠去浮沫 直至肉爛如泥 濾去滓 將汁再入小銅鍋 用桑柴文武火煮 不住手攪 不添熱湯 只用汁煮漸 如稀餳滴 水巾不散 色如琥珀 其膏成矣 火候最要用心 否則壞矣 大段每肉十二斤煉 膏一斤爲度 磁器盛之 是名霞天膏也 用調藥劑初少漸 多沸熱 自然熔化 用和丸劑 則每三分 攙白麪一分 同煮成糊 或用煉蜜 寒天久收 若生黴用重湯煮 過熱天 則冷水窖之 可留三日[飛霞] ○治痰之藥 南星 半夏 所以燥之 橘紅 枳殼 所以散之 茯苓 猪苓 所以滲之 黃連 黃芩 所以降之 巴豆 附子

244) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.291
245) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.289.
246) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.312.
247) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.311.
248) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.313.
249) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1316.
250) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.311.
251) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.322.
252) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.311.
253) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1188.

www.kci.go.kr

流通之義 竹瀝 瓜蔞潤下之義 夫老痰 稠粘膠固於胸臆之間 依附盤泊於腸胃之外 苟非霞天膏之浸潤流動 而能從上從下以出之乎 夫用此膏 吐瀉以去痰積 則不致虛損 元氣所以爲美也 前倒倉法 能治癱勞鼓噎之證 乃虛氣有痰積也 愚意治此四證 於補虛藥中 加霞天膏 以去痰積 必然安愈 無人知此之妙訣也[丹心][254]

治虛痰老痰 稠粘膠固於胸臆 依附盤泊於腸胃 當用此膏 吐瀉不致 虛損如癆瘵 鼓噎於補虛藥中 加之 以去痰積 可收萬全 服此 比之倒倉 更穩 凡治實痰新痰 用南星 半夏 燥之 橘紅 枳殼 散之 猪苓 茯苓 滲之 黃芩 黃連 降之 巴豆 附子 流通之 竹瀝 瓜蔞 潤下之(詳見吐門)[255]

虛人老人痰飮 宜竹瀝枳朮丸 霞天膏(見上)[256]

卽火咳甚者 乾咳而無痰 乃腎水焦枯 邪火獨炎於肺 宜瀉白散(方見五藏) 淸化丸 訶黎勒丸 霞天膏(方見吐門)[257]

16) 謙甫血極膏

治月閉不通 大黃爲末 醋熬成膏丸 如鷄頭大(一云鷄子黃大) 每一丸 熱酒和開 臨臥溫服 大便利 一二行後 紅脈自下 是婦人之仙藥也 加當歸頭 一名單大黃膏[謙甫][258]

氣血盛實 經血遏閉者 宜萬痛丸 血極膏[入門][259]

女子十四歲 衝任脈盛 而血自下 若過期不通 則宜紅花當歸散 血極膏(方見上) 三神丸 牡丹皮湯 通經丸[260]

17) 醫鑑血極膏

一方 治月閉不通 服補藥無效危篤者 大黃酒蒸九次晒四兩 血竭沒藥各五錢 右末 水丸 以四物湯煎水 下七八十丸[醫鑑][261]

18) 單大黃膏

治月閉不通 大黃爲末 醋熬成膏丸 如鷄頭大(一云鷄子黃大) 每一丸 熱酒和開 臨臥溫服 大便利 一二行後 紅脈自下 是婦人之仙藥也 加當歸頭 一名單大黃膏[謙甫][262]

19) 地楡膏✶

地楡 ○赤白帶骨立者 地楡一斤剉 水熬成膏 空心服二合日二[良方][263]

20) 牡蠣膏✶

牡蠣 ○治崩漏及赤白帶下 取粉醋 調作丸 再煆硏細 却用艾醋湯 熬膏和丸 艾醋湯下 五十丸[綱目][264]

21) 牛膝膏

治死血作淋最妙 牛膝一兩剉 水五盞 煎至一盞 入麝香少許 空心服 蓋牛膝 治淋聖藥也[丹心][265]

死血作淋 牛膝膏 最妙(方見下)[266]

22) 水煮木香膏

治一切諸痢 罌粟殼蜜炒三兩 縮砂 肉豆蔻煨 乳香各七錢半 木香 丁香 訶子 藿香 當歸 黃連 厚朴 陳皮 靑皮 白芍藥 甘草炙 各五錢 枳實 乾薑炮 各二錢半 右爲末 蜜丸 彈子大 水一盞 棗一枚 同煎至七分 去棗和滓服[袖珍][267]

23) 淸空膏

治風濕熱 偏正頭痛 黃芩三兩 內半生半酒炒 甘草炙一兩半 防風 羌活 黃連酒炒 各一兩 柴胡七錢 川芎五錢 右爲末

254) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1008.
255) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. pp.371.~372.
256) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.382.
257) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1313.
258) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.451.
259) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.450.
260) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.451.
261) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.451.
262) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.451.
263) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.464.
264) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.465.
265) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.511.
266) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.498.
267) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.547.

www.kci.go.kr

每二錢 茶淸調成膏 臨臥抹口內 少用白湯送下 ○此膏 治諸般頭痛 皆效 惟血虛頭痛 從魚尾相連痛者 不治[東垣][268]

24) 小淸空膏

治同上(頭痛) 片芩細切 酒拌晒乾爲末 茶淸調下二錢 酒亦可[丹心][269]

25) 五膽膏

治眼昏 常見黑花 欲成內障 靑羊膽一枚 黃牛膽汁一合 熊膽二錢半 鯉魚膽七錢半 烏鷄膽五枚 牛黃五錢 右爲末 先將諸膽相和 次入牛黃末 攪勻 銀石器內 慢火熬成膏 食後溫酒 調下半錢 仍將少許 點眼中[類聚][270]

26) 芎芷膏

治口氣熱臭 川芎 白芷等分 爲末 蜜丸 芡實大 每一丸 臨臥噙和[得效][271]

虛火鬱熱 蘊於胸中 乃作口臭 宜芎芷膏[入門][272]

27) 琥珀犀角膏

治咽喉口舌生瘡菌 其效如神 酸棗仁 茯神 人參 各二錢 犀角 琥珀 朱砂 各一錢 龍腦一字 右細末 蜜丸 彈子大 每一丸 以麥門冬煎湯 化服一日 用三五丸[入門][273]

勞心舌生瘡菌 宜琥珀犀角膏(方見上)[274]

28) 蒲黃杏仁鵬砂膏✶

自行被跌仆穿斷舌 心血出不止 以鵝翎蘸米醋頻刷斷處 其血卽止 仍用蒲黃杏仁鵬砂少許 爲末 蜜調成膏 噙化而安[入門][275]

29) 龍腦膏

治喉痺腫痛 薄荷葉一斤 甘草三兩 防風 川芎 桔梗 各二兩 焰硝一兩 白豆蔻三十粒 縮砂五粒 片腦一錢 右爲末 蜜丸 彈子大 噙化嚥下[別方][276]

痘疹膿而不焦 此失淸凉之氣也 如五穀得陽氣 而成熟 非涼風一至 則不能實也 天地嚴肅之氣一加 則萬物秀而實矣 與痘疹何異 須察證候 而淸凉之 則瘡必卽痂矣(當時淸凉飮子下之) 猪尾膏 龍腦膏 並佳[海藏][277]

30) 葱白膏✶

葱白 ○治心腹痛 又治急心疼 牙噤欲死 老葱白三五根 擣爲膏 幹開口 將膏送入咽喉 以香油四兩 灌下 但得葱下喉 其人必甦 腹中蟲積 化爲黃水 微利卽愈 永除根[綱目][278]

31) 萬金一醉膏

治乳癰初起神效 黃瓜蔞一箇去皮 硏爛 甘草五錢 沒藥二錢半右 末好酒二椀煎至一椀 分二服 重者再服 以差爲度 或加當歸白芷乳香亦妙 如要宣毒加皂角刺[直指][279]

婦人乳癰 四十以下 血氣周流 患此可療 年事旣高 血氣耗澁 患此難瘳 惡寒發熱 煩燥大渴 是其候也 甚則嘔吐無已 盖毒氣上衝 所致也 生薑甘桔湯(方見癰疽) 最爲咽間要藥 乳粉托裏散(方見癰疽) 最能返出毒氣 二香散(方見癰疽) 加瓜蔞根 止嘔止渴 兩得其便 更佐萬金一醉膏 能事畢矣(直指) ○初起 便宜隔蒜灸法(方見鍼灸) 切忌鍼刀 能飮者 萬金一醉膏 加芎歸各一兩 兩服 卽效 不飮酒者 瓜蔞散[入門][280]

---

268) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.579.
269) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.580.
270) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.634.
271) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.680.
272) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.679.
273) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.683.
274) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.685.
275) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.689.
276) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.711.
277) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1775.
278) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.758.
279) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.764.

www.kci.go.kr

32) 黑膏

治溫毒發癍 生地黃二兩六錢半 好豉一兩六錢半 猪膏十兩 右合煎 令三分減一 絞去滓 入雄黃 麝香 各一分 爲末和匀 再煎 分三服白湯 化下其毒 從皮中出 卽愈[入門][281]

33) 加味蒼朮膏

久服 精滿氣盛 髮白變黑 齒落更生 蒼朮十斤 擣如泥 入大鍋內 用水二桶 以文武火 煮至十餘椀 絹濾取汁 入磁罐內 以人參 生地黃 熟地黃 黃栢 遠志 杜冲 川芎 胡桃肉 川椒 破故紙 當歸 薑汁 各四兩 靑鹽二兩 朱砂一兩 旱蓮草汁二椀 白蜜二斤 各藥爲末入朮膏內 封固大鍋 水煮 官香二炷爲度 取出埋土中七日 每取二三匙 空心酒湯任下 日二次 養精養氣養神[入門][282]

34) 蒼朮膏

治傷食少食 濕腫四肢無力 酒色過度 勞逸有傷 骨熱痰火 等證 初服 或作熱 或瀉痰 或作飽 或善飢 久服則輕身健骨 蒼朮泔浸去黑皮切片焙一斤 入蒸過白茯苓四兩剉 入水十椀 熬取汁二椀 濾去渣 又入水熬取汁二椀 將渣擣爛 又入水熬 絞取汁一二椀 去渣 都合前汁 再熬至二椀 加蜜四兩 熬至稠滴水成珠爲度 日服二三次 白湯送下 此藥 氣極雄壯 通行脾腎二經[入門][283]

首如裹 單蒼朮膏最妙(方見內傷)[284]

35) 旱蓮膏

烏鬚黑髮如神 旱蓮草十六斤 六月下半月七月上半月 採取 不許水洗 杻乾取汁 對日晒過五日 不住手攪 午時方 加眞生薑汁 好蜜 各一斤 相和如前晒攪 至數日 似稀糖成膏 磁罐收貯 每日空心 好酒一鍾 藥一匙 調服 午後 又一服至二十一日 將白者 摘去 卽生黑者[醫鑑][285]

旱蓮草 ○ 長鬚髮令變白爲黑六月採取汁入薑汁蜜熬爲膏每一匙酒服[本草][286]

36) 參朮膏

治産後 脬損成淋 人參二錢半 白朮二錢 黃芪一錢半 陳皮 桃仁 白茯苓 各一錢 甘草五分 右剉作一貼 水煎猪羊脬後入藥 再煎去滓 溫服空心 ○一産婦 因收生者 不謹損破尿脬 而致淋瀝不禁 遂爲廢疾 因思肌肉在外 而破尙可補完 診其脈 虛甚 試與峻補 服參朮膏 至一月 而安盖血氣 驟長其脬 自完 恐稍遲 亦難成功[丹心][287]

婦人産理不順致傷 遺尿無時 宜用參朮膏[丹心][288]

五虛之證 予嘗治數人 在下則泄瀉不止 在上則吐痰不止者 皆死 盖氣脫無所管攝故也 早用參朮膏救之 十活一二 五實之證 大承氣湯(方見寒門) 加麻黃救之[綱目][289]

37) 蘿葍膏

皂角散 ○治卒中痰塞 皂角 蘿葍子 等分爲末 每二錢 水煎盡服 卽吐[醫林] ○一名 蘿葍膏[得效][290]

38) 轉舌膏

治中風舌强不語 卽凉膈散(方見火門) 加石菖蒲 遠志爲末 蜜丸 彈子大 朱砂爲衣 每一丸 薄荷湯 化下[入門][291]

---

280) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.763.
281) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. pp.799.~800.
282) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.865.
283) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1231.
284) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1161. 內傷門에는 單蒼朮膏가 없고 蒼朮膏만 있다.
285) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.868.
286) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.869.
287) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. pp.1685.~1686.
288) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1685.
289) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.959.
290) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1028.
291) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1030.

www.kci.go.kr

39) 瓊脂膏

治燥病 生地黃二十斤 搗取汁 去渣 白蜜二斤 煎沸去沫 鹿角膠 眞酥油 各一斤 生薑 二兩 搗取汁 右先以慢火熬 地黃汁數沸 綿濾取淨汁 又煎二十沸 下鹿角膠 次下酥油及蜜 同煎候如餳 磁器收貯 每服一二匙 溫酒下[正傳][292]

40) 滋陰淸化膏

止咳嗽 淸痰火 滋化源 肺腎乃人身之化源也 生地黃 熟地黃 並酒浸 天門冬 麥門冬 各二兩 黃栢鹽酒炒一兩半 白茯苓 山藥 枸杞子 白芍藥酒炒 知母鹽酒炒 玄參 薏苡仁炒 各一兩 五味子七錢 甘草生五錢 右爲末 蜜丸 彈子大 每一丸 空心噙化 嚥下 ○痰嗽甚 加陳皮 貝母 各一兩[回春][293]

陰虛火動 宜滋陰降火湯 淸离滋坎湯 後服滋陰淸化膏(方見咳嗽) 六味地黃丸(方見五藏) 愈後用坎离旣濟丸 乃收功保後之藥也[入門][294]

41) 薄荷膏✶

薄荷 ○治骨蒸熱勞 煮取汁服 或生擣取汁飮 又取汁熬爲膏 和衆藥服[丹心][295]

42) 桑椹膏✶

桑椹 ○治小腸熱 及熱生瘡癤 取黑椹擣取汁 入瓦器熬成膏 入煉蜜攪勻 每服二三匙[丹心][296]

黑椹搗濾去滓 入石器中 入蜜熬膏 每取二三匙 沸湯點服 止渴 生精神[本草][297]

292) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1168.
293) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1316.
294) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1187.
295) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1192.
296) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1192.
297) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1410.

43) 補眞膏

人參四兩 山藥蒸熟去皮 芡仁蒸 蓮肉 棗肉 杏仁 胡桃肉 各一斤 沈香三錢 另爲末 已上俱擣 爛煉蜜三斤 眞酥油一斤 和蜜蒸化 右將前八味 和成一處 磨極細末 入酥蜜內 攪勻如膏 盛磁器內 封口 淸晨 用白湯 調數匙服 臨臥又一服 大補眞元 攻不能盡述[回春][298]

44) 參朮調元膏

扶元氣 健脾胃 進飮食 潤肌膚 生精血 眞仙丹也雪 白朮一斤 人參四兩 並剉作片 入磁鍋 淨水十椀 熬取汁二椀 濾出滓 又添水熬 取汁二椀 去渣 將二次汁 濾淨 慢火熬至二椀 加入蜜半斤 再熬 至稠埋土中三日 取出 日服三四 次白湯下[回春][299]

虛勞證 肌肉消瘦 飮食不進 此是脾虛 宜用天眞元 還元丹(二方見上) 橘皮煎元 參苓白朮散(方見內傷) 烏朮丸 潤腎丸 大山芋元 參朮調元膏 參苓白朮丸 九仙王道糕(三方見內傷)[300]

45) 白朮膏

治內傷脾胃 不和飮食 少進無味 或時吐瀉 取一斤切焙 入陳皮四兩 熬取汁 如上法 入蜜 令稠服 如上法[醫鑑][301]

46) 當歸膏

治五勞七傷 諸虛百損 補養脾胃 滋榮筋骨 枸杞子 當歸 各五兩 生乾地黃 白朮 白芍藥(以米粉同炒) 各四兩 白茯苓 三兩 薏苡仁二兩 山藥 麥門冬 各一兩二錢半 地骨皮 蓮肉 人參 各一兩 熟地黃 貝母 甘草 各七錢半 天門冬五錢 五味子二錢半 琥珀六分 右用水五升 入藥 微火煎之 再加水五升 如此七次 濾去滓 文武火煎 每斤加熟蜜四兩 共熬成膏 每取二茶匙 空心白湯調下[入門][302]

298) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1229.
299) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1229.
300) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1252.
301) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. pp.1231.~1232.
302) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1260.

www.kci.go.kr

47) 補精膏

治虛勞 益眞氣 助胃潤肺 山藥八兩 另爲末 胡桃肉四兩 硏爲泥 杏仁炒四兩 另爲末 雄牛前脚髓四兩 白蜜一斤 右髓蜜同煮 去滓 入三味和勻 入缸封固 重湯煮半日 取出 每一匙 溫酒調服[醫林][303]

48) 補髓膏

治虛勞 補精血 黃犍牛前脚髓三斤 白蜜四斤 去滓 人參 杏仁 並另末 各四兩 胡桃肉 五十箇 另硏爲泥 熟地黃 蒸爲泥 五味子 另末 各一兩 右拌勻 盛磁缸 重湯煮 一伏時 取出 每服一大匙 溫酒下 日三次[醫林][304]

49) 新書潤肺膏

治虛勞 久嗽 肺痿 羊肺一具 杏仁 另硏 柿霜 眞酥 眞蛤粉 各一兩 白蜜二兩 右先將羊肺 洗淨 次將五味 入水攪粘 灌入肺中 白水煮熟 如常法食之 與上藥 相間服 亦可[新書][305]

50) 丹心潤肺膏

治同上(咳嗽痰喘) 紫菀 杏仁 款冬花 各一兩 麻黃 桔梗 訶子 細辛 各五錢 枯白礬一錢 胡桃肉一兩 生薑二兩 取汁 淸油八兩 蜜一斤 右先將油煉熟 次入蜜煉 去沫 却下藥末 攪勻 每服二三匙 白湯調下 臨臥時[丹心][306]

痰喘 宜喘緡湯 喘緡導痰湯 加減三奇湯 貝母散 平肺散 紫蘇半夏湯 定喘化痰湯 潤肺膏 蘇子導痰降氣湯 大蘿皂丸 祛痰丸[諸方][307]

51) 白鳳膏

治虛勞 肺痿 嗽血 黑觜白鴨一隻 大棗肥者三升 參苓平胃散 末一升 陳煮酒一瓶 右將鴨縛定 量患人陰酒 多少隨量 以酒湯溫將鴨項割開滴血 入酒攪勻 飮之 直入肺經 潤補其肺 却將鴨乾去毛於脇遺開一孔 取去腸雜拭乾 次將棗子去核 每箇中納參苓平胃散 塡入鴨腹中 用麻扎定 以砂缸一箇 置鴨在內 四園用火慢煨 將陳酒煮乾 作三次 添入煮乾爲度 然後 食之 基 棗子陰乾 隨意食之 用參湯 送下 後服補髓丹[新書][308]

52) 朮膏✶

朮 ○主五勞七傷 健脾胃 能益壽 作末 和酒服 或蜜丸服之 或煎汁熬爲膏 久服尤佳[本草][309]

53) 八仙膏

治噎食 生藕汁 生薑汁 生梨汁 生蘿蔔汁 甘蔗汁(無則砂糖代之) 白果汁(卽銀杏) 竹瀝 蜂蜜 各一盞 右和勻 盛飯甑 蒸熟 任意食之[回春][310]

54) 潤腸膏

治膈噎反胃 甚捷新採 威靈仙四兩 搗取汁 生薑四兩 取汁 眞麻油二兩 白砂蜜四兩 煉去沫 右同入銀石器內 慢火煎如餳 時時以匙挑 食之一料 決效[正傳][311]

55) 四汁膏

止咳嗽 消痰 降火 雪梨汁 藕汁 生蘿蔔汁 生薄荷汁 右等分 入砂糖屑和勻 慢火熬成膏 以匙抄服[入門][312]

56) 寧嗽膏

治陰虛火動 咳嗽咯血 天門冬 白朮 各八兩 百部根 杏仁 貝母 百合 各四兩 款冬花五兩 紫菀三兩 右麄剉 以長流水一斗 煎取三升 又易新水 煎取三升 如此三次 合取汁 入飴糖八兩 蜜十六兩 再熬 入阿膠四兩 白茯苓細末四兩 和勻 成膏 每服三五匙 不以時[醫鑑][313]

---

303) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1261.
304) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. pp.1261.~1262.
305) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1263.
306) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1321.
307) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1320.
308) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1263.
309) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1267.
310) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1290.
311) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1294.
312) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1307.

www.kci.go.kr

勞嗽 宜人參淸肺湯加味 二母丸 人參芎歸湯加味 人參紫菀散 潤肺丸 補肺湯 溫金散 大寧嗽湯 知母湯 寧嗽膏 大阿膠元[諸方][314]

57) 加味百花膏

治久嗽不愈 紫菀 款冬花 各一兩 百部根五錢 右爲末 每三錢 薑三梅一 煮湯 調下食後[入門][315]

58) 三稜膏

三稜 ○ 主老癖癥瘕結塊取三稜濃煎成膏每朝取一匕酒服日二[本草][316]

59) 藕汁膏

治胃熱消中 藕汁(白藕尤佳) 生地黃汁 牛乳汁 和黃連 天花粉末佐 而薑汁 白蜜 爲膏 以匙抄 取徐徐留舌上 以白湯送下 日三四次[丹心][317]

60) 生地黃膏

治渴 通用生地黃二斤 蜜一椀 白茯苓一兩 人參五錢 右地黃洗搗取汁 同蜜煎至半 次入參苓末拌和磁器盛 以匙挑服溫水送下[得效][318]

61) 荔枝膏

止消渴生津液 乳糖二十六兩 淸蜜十四兩 烏梅肉八兩 生薑五兩取汁 麝香五分 右先取淸蜜 烏梅肉 以水一斗五升 熬至半 濾去滓 下乳糖 熬候糖熔化 入薑汁 再熬 乃入麝和勻 每取一大匙 新水調下日二三[類聚][319]

62) 綱目國老膏

治癰疽 能消腫逐毒 使不內攻 大甘草二斤槌碎 河水浸一宿揉 令漿汁濃盡去筋滓 用絹濾過 以銀石器慢火熬成膏 分六次溫酒 或白湯調下 能疎導惡毒[綱目][320]

63) 精要國老膏

治懸癰橫紋 大甘草帶節一兩四寸 切以山澗長流水一椀 文武火 慢慢蘸水灸 自早至午 乾則投前水再灸 直待水盡 看甘草中心 潤透爲度 細剉 好酒二升 煎取一升 空心隨量飮之 三日一服 二三服可保 無虞此藥 雖不卽消 過二十日後 必盡消 有人患此 癰已破 服兩貼 瘡卽合 甚妙[精要][321]

64) 太乙膏

治五發癰疽 一切惡瘡及蛇虎犬蝎 幷湯火刀斧打撲損傷 可內服外貼 ○若作丸服之 則蛤粉爲衣 ○一名 神仙太乙膏(方見雜方)[322]

內疽用內托之藥 外以鍼開之而愈 先用四物湯(方見血門) 加桔梗香附生薑煎服 潰後亦用四物調理 雲母膏太乙膏作丸 兼服[丹心][323]

肺癰...雲母膏 作丸服 太乙膏亦可[入門][324]

胃脘癰...雲母膏作丸 以桔梗甘草湯呑下 太乙膏亦佳[入門][325]

65) 神仙太乙膏(太乙膏)

玄參白芷當歸肉桂赤芍藥大黃生地黃各一兩 剉 浸麻油二斤 春五夏三秋七冬十日 慢火煎 令白芷焦黃色 去滓 下黃丹一斤 極攪勻 滴水中成珠 乃候凝 作片聽用[局方][326]

---

313) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1309.
314) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1308.
315) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1315.
316) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1369.
317) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1402.
318) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1406.
319) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1406.
320) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1487.
321) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1503.
322) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1495.
323) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1496.
324) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1497.
325) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1500.

www.kci.go.kr

治五發癰疽 一切惡瘡及蛇虎犬蝎 幷湯火刀斧打撲損傷 可內服外貼 ○若作丸服之 則蛤粉爲衣 ○一名 神仙太乙膏(方見雜方)[327]

66) 雲母膏

雲母焰硝 甘草各四兩 槐枝 柳枝 陳皮 桑白皮 側栢葉 水銀 各二兩 川椒 白芷 沒藥 赤芍藥 肉桂 當歸 鹽花 黃芪 血竭 菖蒲 白芨 芎藭 木香 白斂 防風 厚朴 麝香 桔梗 柴胡 松脂 人參 黃芩 蒼朮 草龍膽 合歡 乳香 附子 茯苓 高良薑 各五錢 黃丹十四兩 淸油二斤半 右除雲母 焰硝 血竭 沒藥 乳香 麝香 黃丹 鹽花 外餘藥剉 浸油中 七日後 文火煎 候白芷 附子 焦黃色 以布絞去滓 再熬後 下黃丹等 八味 細末 以柳木篦 不住手 攪直至膏 凝滴水中 成珠爲度 傾在磁器內 彈水銀在上 每用刮去水銀 凡癰疽 瘡腫 外貼 內服 神效[局方][328]

治一切癰疽 惡瘡 腫毒 折傷 瘰癧 骨疽 內疽 乳癰 肺癰 腸癰 並可外貼內服(方見雜方) ○凡五發 及發背 外以敗蒲煎水 洗瘡貼之 又取一兩 作丸 梧子大 溫酒呑下三十丸 瘰癧 骨疽 亦如之 腸癰 作丸 甘草湯呑下 下膿血 卽愈 一切瘡疽 外貼立差 忌食羊血[局方][329]

內疽用內托之藥 外以鍼開之而愈 先用四物湯(方見血門) 加桔梗香附生薑煎服 潰後亦用四物調理 雲母膏太乙膏作丸 兼服[丹心][330]

肺癰...雲母膏 作丸服 太乙膏亦可[入門][331]

胃脘癰...雲母膏作丸 以桔梗甘草湯呑下 太乙膏亦佳[入門][332]

67) 善應膏

黃丹八兩 白膠香 乳香 沒藥 並另硏當歸 白芷 杏仁 大黃 草烏 川烏 赤芍藥 檳榔 生乾地黃 川芎 瀝靑 另硏亂髮 各一兩 右香油一斤 浸藥三宿 慢火熬至黑色 再入葱白 亂髮 煎 少時濾去滓 再上慢火熬却入黃丹 以柳篦 不住手攪滴水 成珠 不散乃入乳沒膠香十分 攪勻盛器沈水中 三日取出 聽用治諸般惡瘡腫毒及諸傷[得效][333]

治諸般腫毒 惡瘡 發背 腦疽 瘰癧 打撲 閃肭 金瘡 杖瘡 蛇虫 犬馬咬 疥癬等疾 並外貼 內服 ○內疽 肺癰 腸癰 作丸如上法 服(方見雜方)[334]

68) 參苓白朮膏

未潰時嘔者 當作毒氣上攻 治之潰後 當作陰虛補之 若年老人 潰後嘔不能食 宜參苓白朮膏(方見內傷)[335]補之 河間 謂瘡瘍嘔者 濕氣侵于胃也 宜倍白朮[丹心][336]

69) 乳麝雲母膏

治漏瘡 穿山甲一百片 蚌粉同炒候焦 起泡去粉 取甲爲末四兩 入乳香末一錢 麝香末半錢 夾和雲母膏十五貼 和丸梧子大 溫酒下 三十丸[直指][337]

70) 蝎猫膏

牛皮癬...一方 治遍身牛皮癬 川烏草烏何首烏白芷蘇木 各等分 右#剉 入臘猪脂 同熬至白芷焦色 去滓 候冷 入鹽少許 常挑一匙 空心 酒調下[得效][338]

326) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1634.
327) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1495.
328) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1635.
329) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1495.
330) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1496.
331) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1497.
332) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1500
333) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1636.
334) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1495.
335) 內傷門에 처방이 안 나옴.
336) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1515.
337) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1549.
338) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1553.

www.kci.go.kr

71) 益母膏

一名 返魂丹 通治姙娠諸病 及催生 神效 又治橫生 逆産 及死胎不出 胞衣不下 益母草 重午日不犯鐵器 採取 洗淨搗取汁 銀石器熬成膏 右每取一大匙 溫酒 或白湯化下[丹心][339]

油蜜童尿和服 最治難産 和益母膏尤妙[340]

茺蔚 ○卽益母草也 主産前 産後 百病 能行血養血 採取莖葉搗取汁 於銀石器熬成膏 和酒服之 最治難産 及死胎胞衣不下 或搗取汁一小盞 和酒一合 溫服[本草][341]

72) 寧神膏

治産後亡血 心神昏悶 言語失常 不得睡臥 酸棗仁炒 人參 赤茯苓 各一兩 琥珀七錢半 朱砂 乳香 各五錢 右爲末 燈心 大棗煎湯 調下一錢 或蜜丸 彈子大 薄荷湯化下一丸[入門][342]

産後昏冒不省 瞑目無所知 盖因血暴亡 心神無所養故也 甚則循衣摸空 錯語失神 宜生地芩連湯(方見血門) 全生活血湯(方見胞門) 寧神膏茯苓散柏子仁散[諸方][343]

73) 牛黃膏

治産後 熱入血室 朱砂 鬱金 各三錢 牛黃二錢半 牡丹皮二錢 甘草一錢 龍腦五分 右爲末 蜜丸 皂子大 每一丸 井水化下[玉機][344]

産後血虛 熱入血室 以致發熱煩躁 晝輕夜重 或譫語如見鬼 或往來寒熱 宜用柴胡四物湯涼血地黃湯牛黃膏[保命][345]

熱入血室 其血必結而不行 小柴胡加牧丹皮桃仁 或小柴胡合四物湯主之 牛黃膏亦主之(方見婦人)[入門][346]

339) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1690.
340) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1665.
341) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. pp.1700.~1701.
342) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1678.
343) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1678.
344) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1679.
345) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1678.
346) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1122.

74) 辟邪膏

治小兒中惡 降眞香 白膠香 沈香 虎頭骨 人參 鬼箭羽 草龍膽 各五錢 右爲末 入雄黃五錢 麝香一錢 煉蜜和勻 作膏取少許 以乳香湯化 下兒口中 又令兒帶 及燒臥內 尤妙[錢氏][347]

中惡者 其狀卒然心腹刺痛 悶亂欲死 人中靑黑 卽服蘇合香元 末醒 以皂角末吹鼻 兼用辟邪膏 又以唾和麝香一錢 重硏 和醋一合服之 卽差[錢乙][348]

75) 猪乳膏

治胎驚 夜啼 琥珀 防風 各一錢 朱砂五分 爲末 猪乳汁 調一字 抹兒口中[入門][349]

胎警癎風.....辰砂膏最妙 猪乳膏鎭驚散(二方並見上) 太乙散亦佳[入門][350]

76) 花火膏

燈心散 ○治小兒心燥 夜啼 燈花三四顆硏細以燈心煎湯調塗口中以乳汁送下日三 ○一方燈花七枚鵬砂一字朱砂少許硏細蜜調抹脣上立止[三因] ○一名花火膏[正傳][351]

77) 辰砂膏

治胎驚 癎風 及噤口風 辰砂三錢 玄明粉二錢 鵬砂 馬牙硝 各一錢半 全蝎 眞珠末 各一錢 麝香一字 右爲末 油紙封裹 自然成膏 每取一豆許 薄荷湯調下 或乳汁調 塗乳頭上 令兒吮之[入門][352]

胎警癎風.....辰砂膏最妙 猪乳膏鎭驚散(二方並見上) 太乙散亦佳[入門][353]

347) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1716.
348) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1716.
349) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1717.
350) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1724.
351) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. pp.1718~ 1718.
352) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1724.
353) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1724.

www.kci.go.kr

78) 大靑膏

治急驚風 宜用此發散 白附子一錢半 天麻 靑黛 各一錢 烏蛇肉 蝎梢 各半錢 朱砂 天竺黃 麝香 各一字 右細末 生蜜和成膏 月內兒粳米大半 歲兒半皂子大 一歲兒一皂子大 以薄荷竹葉煎湯化下[得效][354]

百日內發搐 眞者 不過兩三次 必死 假者 頻發 不爲重 眞者內生驚癎 假者 外傷風冷 盖氣血未實 不能勝任 乃發搐也 欲知假者 口中氣出 熱治之 可發散 大靑膏主之(方見下)[錢乙][355]

急驚乃卒然得之 心受驚 肝主風 致筋脈搐搦 肝又主筋 宜通心飮(方見上) 瀉靑丸凉驚元大靑膏[得效][356]

傷風 宜用大靑膏(方見上) 雄黃膏[綱目][357]

79) 驅風膏

治肝風 發驚搐 及胎風 辰砂 蝎梢 當歸 草龍膽 川芎 梔子 大黃 羌活 防風 甘草 各一錢 右爲末 入麝香少許 砂糖和丸 芡實大 每一丸 薄荷竹葉蜜湯化下[丹心][358]

80) 靈神膏

赤茯神 朱砂 各一兩 麥門冬 五錢 麝香二錢半 右爲末 蜜和作小餠子 每一餠 臨睡以薄荷湯化下 神效 ○一老醫 乃三世小兒科 家傳只有四五藥愈病 無數如小兒驚搐 多是熱證 不宜便用驚風藥 只以導赤散(方見五藏) 加防風 竹葉 同煎 用二三貼 導去心 經邪熱 其搐 便止 次服 靈神膏[集驗][359]

81) 寧心膏

治小兒不定 恍惚不寧 恐畏多哭 睡中驚魘 朱砂二錢 人參 白朮 白茯苓 茯神 山藥 羌活 甘草 各一錢 龍腦 麝香 各一字 右爲末 蜜丸 芡實大 以薄荷湯化下一丸[丹心][360]

82) 釣藤膏

治驚風 內釣 木香 薑黃 各二錢 乳香 沒藥 各一錢半 木鱉子肉五箇 右爲末 蜜調成膏 收罐內 以釣藤煎湯 或薄荷湯化下少許[入門][361]

83) 露星膏

治同上(脊痟) 黃芪蜜水炒 胡黃連 地骨皮 柴胡 各等分 右爲末 蜜丸 芡實大 隔宿酒浸露一宿 次日澄去酒 薄荷湯浸 服之[湯氏][362]

84) 助胃膏

治小兒吐瀉 和脾胃進乳食 最妙 山藥五錢 人參 白朮 白茯苓 陳皮 甘草各二錢半 木香一錢 縮砂二十箇 白豆蔻七箇 肉豆蔻二箇 右爲末 蜜丸 皂子大 每一丸 米飮化下 或爲末 木瓜湯 調下一錢[湯氏][363]

小兒吐瀉 通用助胃膏 最妙[湯氏][364]

85) 雄黃膏

治傷風 溫壯熱 引飮 寒水石五錢 甛硝 甘草末 各三錢 龍腦一字 朱砂五分 雄黃小棗大研 蘿蔔根水幷醋一大盞煮令盡 右研勻 煉蜜成膏 薄荷湯 化下半 皂子大[錢乙][365]

傷風宜用大靑膏(方見上]雄黃膏[綱目][366]

86) 龍鳳膏

烏鷄卵一箇 地龍細小活者一條 右鷄卵開一小竅 入地龍在內 皮紙糊其竅 飯鍋上蒸熟去地龍 與兒食之 每歲立春日 食一枚 終身不出痘疹 覺鄉隣有此證 流行食一二枚 亦效[正傳][367]

---

354) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1725.
355) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1723.
356) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1724.
357) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1754.
358) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1726.
359) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1727.
360) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1727.
361) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1736.
362) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1744.
363) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1753.
364) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1752.
365) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1754.
366) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1754.

www.kci.go.kr

天行痘疹鄕隣有此證預服之能活血解毒則不染宜獨聖丹兎紅丸(二方並見上)龍鳳膏[醫鑑][368]

87) 猪尾膏

治痘瘡陷伏 倒靨不起發 或毒氣入裏 黑陷危惡者 龍腦一錢 刺取小猪尾尖血 和丸小豆大 淡酒 或紫草飮化下 熱盛則新汲水化下 神驗 盖猪尾無一時休息 取振掉發揚之意也[活人][369]

出盛而內外 壅熱煩渴 譫狂 宜用猪尾膏(方見下)[入門][370]

當結膿窠 而不結 由血熱相薄 毒氣內外灌注 必復入心 宜用猪尾膏(方見下)[入門][371]

痘疹膿而不焦 此失淸凉之氣也 如五穀得陽氣 而成熟 非涼風一至 則不能實也 天地嚴肅之氣一加 則萬物秀而實矣 與痘疹何異須察證候 而淸凉之 則瘡必卽痂矣(當時淸凉飮子下之) 猪尾膏 龍腦膏 並佳[海藏][372]

不快出 不起脹 不貫膿 不收靨 通用猪尾膏 救之(方見下)[373]

初出狀如蚊咬 色黑者 毒氣與熱相薄也 宜用人齒散 猪尾膏(方見下)[入門][374]

痘毒入藏府 咽喉閉塞 宜用猪尾膏(方見下)[入門][375]

痘黑倒陷 猪尾膏龍腦膏子無比散 無不驗[活人][376]

88) 紫草膏

治痘疹不起 脹白 附子 麻黃 紫草茸 甘草 各五錢 蟾酥一錢 全蝎二十箇 白殭蠶炒八箇 右細末 另將紫草一兩剉 熬成膏 又用蜜二兩 入酒半盞 煉過同紫草膏 攪勻調藥末丸如皂角子大 一歲兒半丸 三歲兒一丸 用之紅紫黑陷者 紫草湯化下 淡白灰陷者 好酒化熱服[醫鑑][377]

89) 猪心龍腦膏

當靨不靨 謂之慢有毒盛 不結痂者 猪心龍腦膏 最妙(方見下) 有觸穢不收靨者 異功散 調四糞散 最妙(二方並見下)[入門][378]

龍腦膏子 ○治痘瘡 未透心煩狂躁 氣喘妄語 或見鬼神 或已發而倒靨黑陷 不速治則毒入藏 必死 梅花腦子一錢 硏細 滴猪心血和 丸如豆子大 每服一丸 井華水化下 心煩狂躁 紫草湯化下 黑陷 溫淡酒化下 服畢少時 心神便定得睡 瘡復透活 ○一名 猪心龍腦膏[活人][379]

90) 龍腦膏子

○ 治痘瘡 未透心煩狂躁 氣喘妄語 或見鬼神 或已發而倒靨黑陷 不速治則毒入藏 必死 梅花腦子一錢 硏細 滴猪心血和 丸如豆子大 每服一丸 井華水化下 心煩狂躁 紫草湯化下 黑陷 溫淡酒化下 服畢少時 心神便定得睡 瘡復透活 ○一名 猪心龍腦膏[活人][380]

痘瘡初出光壯 忽然黑陷 心煩狂躁 氣喘妄語 或見鬼神 不速治則毒入藏 必死 宜回生散龍腦膏子[綱目][381]

痘黑倒陷 猪尾膏龍腦膏子無比散 無不驗[活人][382]

91) 紫河車膏★

婦人胞衣 ○主血氣羸瘦 勞傷虛損 面黧皮黑腹 內諸病漸瘦瘁者[本草] ○卽産後胞衣也 一名紫河車 一名混沌皮 亦名混元衣 男胎首生者佳 如無則壯盛婦人 次胎亦好 取得以竹器盛長流水浸一刻 以取生氣洗淨去筋膜 以蔑籠盛之外

367) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1765.
368) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1765.
369) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1790.
370) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1770.
371) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1774.
372) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1775.
373) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1775.
374) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1776.
375) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1782.
376) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1789.
377) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1773.
378) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1774.
379) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1791.
380) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1791.
381) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1789.
382) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1789.

www.kci.go.kr

以紙糊使不泄氣 焙乾要用 時以米醋浸一宿 焙乾用[正傳] ○一法 洗斷血脉 入麝香一錢砂鍋內 熬膏用之[丹心][383]

92) 瓦壟子膏✶

蚶 ○性溫 味甘 無毒 利五藏 健胃濕中 消食起陽(肉之功也) ○殼火煆醋淬爲末 醋膏丸服 治一切血氣冷氣癥癖 ○出海中味最重殼如瓦屋 故一名瓦壟子[本草] ○瓦壟子 能消血塊 次消痰積[正傳] ○疑是今之瑤柱也 其肉味甘 而殼似瓦屋出 咸鏡道海中[俗方][384]

93) 竹膏✶

天竺黃 ○性寒(一云平) 味甘 無毒 治中風痰塞 卒失音不語 去諸風熱 主小兒驚風 天弔 客忤 癇疾 療金瘡 ○生南海邊竹內 塵沙結成如黃土着竹作片 凉心去熱 小兒病 最宜一名 竹膏[本草][385]

Ⅳ. 고 찰

1. 主治病症 分類

1) 외용고

外用膏는 주로 外科·皮膚科疾患에 많이 쓰였는데 凍瘡 뿐만 아니라 각종 癰疽나 瘡, 疥, 癬에 神效를 나타낸다고 하였으며, 惡寒에 禦寒膏를 사용하여 발바닥에 붙이거나, 大小便不通 등의 內科疾患에 사용하기도 하였다. 이 외에도 眼疾患에 點眼하기도 하였으며, 難産, 小兒胎風에 膏劑를 붙여 치료하였고, 머리털이 黃色이 되며 빠지는 경우 머리카락이 새로 나게 하기 위해 사용하기도 하였다. 또한 머리를 染色하거나 아이가 젖을 떼도록 할 때도 사용되었다.

383) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1855.
384) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.1910.
385) 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 서울. 法仁文化社. 2007. p.2022.

外用膏를 사용하여 치료한 병증을 분류하여 정리하면 다음과 같다.

표 1. 主治病症別 外用膏 分類

分科	關聯 疾患	處方名
內科	大小便不通, 痢, 惡寒, 臍腹痛	納臍膏, 貼臍膏, 廻生新膏, 回春蝸牛膏, 入門蝸牛膏, 塗臍膏, 禦寒膏, 代灸塗臍膏, 代灸膏, 丹心琥珀膏, 救苦膏, 天仙膏, 禦風膏
外·皮膚科	癰疽, 積聚, 痔漏, 諸瘡, 折傷, 面上諸瘡, 臁瘡, 手足皸製, 疥癬, 痔瘡, 紫癜, 筋寒諸病	洪寶膏, 硫黃膏, 玉容膏, 玉容西施膏(袖珍玉容膏), 爐灰膏, 黃蠟膏, 入門三聖膏, 秘傳神應膏, 辰砂膏, 入門熊氷膏, 綱目熊氷膏, 熊膽膏(得效熊氷膏), 痔藥膏子, 種杏田螺膏, 丹心田螺膏, 正傳神異膏, 得效神異膏, 硝膽膏, 蝎猫膏, 六香膏, 水調膏, 丹心琥珀膏, 局方琥珀膏, 硝黃膏(入門琥珀膏), 五仙膏, 貼痞膏, 外敷神膏, 涌泉膏, 去水膏, 巴豆膏, 乳香膏, 水澄膏, 沈水膏, 三神膏, 萬應膏, 入門糯米膏, 綱目糯米膏, 蟾酥膏, 蟾蜍膏, 大蒜膏✶, 雲母膏, 麥飯石膏(精要靈應膏), 神仙太乙膏(太乙膏), 善應膏, 陶潛膏, 白龍膏, 必勝膏, 玉脂膏, 十香膏, 綠雲膏, 化瘤膏, 得效南星膏, 醫鑑南星膏, 雄黃膏, 入門麻豆膏, 丹心神應膏, 龍骨膏, 必勝膏, 馬齒膏, 馬齒莧膏✶, 窯土膏, 神捷膏, 翠玉膏, 磨風膏, 大馬齒膏, 臘享膏, 大黃膏, 紫草膏, 二黃膏, 貝母膏, 蛇含膏, 將軍膏, 醫鑑二生膏, 得效二生膏, 種杏二生膏, 天南星草烏膏✶, 蜘蛛輕粉膏✶, 塗臍膏, 驢蹄蕎麥草烏膏✶, 杏仁乳香硫黃膏✶, 皂角子膏✶, 麻油豆豉膏✶, 百花膏, 羊骨髓輕粉膏✶, 芥子膏✶, 白油麻膏✶, 鷹屎白膏✶, 百鴿糞膏✶, 蟾蜍肪膏✶, 鼴鼠膏✶, 柳枝膏✶, 柳葉膏✶, 白楊樹皮膏✶, 黃丹膏✶, 萆麻子膏✶, 得效如聖膏, 金絲膏
五官科	瞖障, 偸鍼, 鼻衄, 瞖膜, 眼痛, 耳聾, 齒痛, 傷眼, 眼昏, 眼花, 爛弦風, 鼻塞	洪寶膏, 浦黃膏, 南星地黃膏✶, 磨瞖膏, 花草膏, 三光膏, 地黃膏, 五黃膏, 寶鑑龍腦膏, 局方春雪膏, 得效春雪膏, 二百味花草膏, 楓膏, 五膽膏, 百點膏, 點瞖膏, 明鏡膏, 蕤仁膏, 臙脂膏, 護眼膏(黃栢膏), 護眼膏, 細辛膏, 辛夷膏, 地黃大黃膏✶, 猪膽龍腦膏✶, 雄黃定痛膏, 皂角草烏膏✶
婦人科	難産, 死胎不下, 乳癰, 乳懸症, 産後陰戶脫出	丹參膏, 入門如聖膏, 藜蘆膏, 桃仁五倍子白礬膏✶
小兒科	小兒胎風,小兒白禿頭瘡, 斷乳	醫林龍腦膏, 五通膏, 香螺膏, 畫眉膏, 如聖黑膏, 泥金膏
其他	染色, 生髮	外染烏雲膏, 豹肉脂膏, 綱目三聖膏

www.kci.go.kr

2) 내복고

內服膏는 만성질환이나 허약한 환자에게 滋養을 목적으로 하는 것이 많아서 內科疾患에 많이 사용되었으며, 癰疽, 瘡과 같은 外科·皮膚科疾患이나 眼科, 咽喉科疾患에도 사용되었다. 또한 産後淋病, 白赤帶下 등과 같은 婦人科나 小兒中惡, 胎驚癎風과 같은 小兒科에도 사용되었고, 驚悸, 癲狂 등의 神經精神科疾患에도 사용되었다.

內服膏를 사용하여 치료한 병증을 분류하여 정리하면 다음과 같다.

표 2. 主治病症別 內服膏 分類

分科	關聯 疾患	處方名
內科	生精補氣[386], 咳·嗽·唾·咯·吐血, 勞痰, 勞瘵, 痢疾, 頭痛, 心腹痛, 躁病, 骨蒸熱, 內傷, 虛勞, 咳嗽, 喘息, 反胃, 消中, 消渴, 癩疝, 客忤, 中風	入門瓊玉膏, 衛生方瓊玉膏, 益壽永眞膏, 天門冬膏, 枸杞子膏★, 五味子膏★, 人蔘膏, 加味蒼朮膏, 參朮調元膏, 補眞膏, 坎离膏, 玄霜雪梨膏, 霞天膏, 牛膝膏, 水煮木香膏, 淸空膏, 小淸空膏, 葱白膏★, 蘿蔔膏, 轉舌膏, 瓊脂膏, 薄荷膏★, 蒼朮膏, 白朮膏, 當歸膏, 補精膏, 補髓膏, 潤肺膏, 白鳳膏, 朮膏★, 八仙膏, 潤腸膏, 四汁膏, 寧嗽膏, 加味百花膏, 滋陰淸化膏, 藕汁膏, 生地黃膏, 荔枝膏, 參苓白朮膏, 紫河車膏★, 蜘蛛膏★, 竹膏★, 玄霜膏
外·皮膚科	斷舌, 痰疹, 瘡, 癰疽, 漏瘡, 牛皮癬	蒲黃杏仁鵬砂膏★, 黑膏, 桑椹膏★, 綱目國老膏, 精要國老膏, 太乙膏(神仙太乙膏), 雲母膏, 善應膏, 乳麝雲母膏, 蝎猫膏, 瓦韞子膏★
五官科	眼昏黑花, 口臭, 咽喉痛, 急喉閉	五膽膏, 芎芷膏, 琥珀犀角膏, 龍腦膏, 人蔘膏
婦人科	月閉不通, 赤·白帶下, 難産, 産後熱入血室, 産後淋病	醫鑑血極膏, 謙甫血極膏, 單大黃膏, 地楡膏★, 牡蠣膏★, 益母膏, 寧神膏, 牛黃膏, 參朮膏, 大全良方寧志膏, 萬金一醉膏
小兒科	小兒中惡, 胎驚夜啼, 小兒心燥夜啼, 小兒癎風, 驚風, 胎風, 驚風內釣證, 嘔吐泄瀉, 痘瘡	辟邪膏, 猪乳膏, 花火膏, 大靑膏, 辰砂膏, 驅風膏, 靈神膏, 寧心膏, 釣藤膏, 露星膏, 助胃膏, 雄黃膏, 龍鳳膏, 猪尾膏, 紫草膏, 猪心龍腦膏(龍腦膏子), 龍腦膏, 竹膏★
神經精神科	驚悸, 癲狂, 虛煩	朱砂膏, 局方寧志膏, 一醉膏

386) 生精補氣는 처방의 효능을 말하는데 주로 虛勞疾患을 치료하데 쓰이므로 內科疾患으로 분류하였다.

2. 出典別 處方 分類

1) 외용고

外用膏는 『入門』에서 31개 처방, 『得效』에서 21개 처방을 인용하는 등 총 27종 서적에서 인용하였는데, 인용서적별 처방을 분류해 보면 다음과 같다.

표 3. 出典別 外用膏 分類

引用書籍	處方名
入門	蕤仁膏, 二百味花草膏, 細辛膏, 丹參膏, 入門如聖膏, 琥珀膏, 爐灰膏, 藜蘆膏, 入門熊氷膏, 入門蝸牛膏, 入門三聖膏, 硝黃膏(入門琥珀膏), 貼痞膏, 外敷神膏, 巴豆膏, 入門糯米膏, 入門麻豆膏, 磨風膏, 龍骨膏, 馬齒膏, 窯土膏, 入門黃蠟膏, 大馬齒膏, 畫眉膏, 護眼膏(黃栢膏), 臙脂膏, 皂角膏★, 驢蹄蕎麥草烏膏★, 杏仁乳香硫黃膏★, 芥子膏★, 黃丹膏★
得效	硫黃膏, 磨臀膏, 地黃膏, 得效春雪膏, 百點膏, 得效如聖膏1, 得效如聖膏2, 得效黃蠟膏, 熊膽膏(得效熊氷膏), 天仙膏, 塗臍膏, 善應膏, 蟾蜍膏, 得效南星膏, 得效神異膏, 如聖黑膏, 二黃膏, 得效二生膏, 猪膽龍腦膏★, 地黃大黃膏★, 皂角草烏膏★
醫鑑	納臍膏, 三光膏, 明鏡膏, 禦寒膏, 水調膏, 三神膏, 陶潛膏, 玉脂膏, 醫鑑南星膏, 神應膏, 神捷膏, 將軍膏, 醫鑑二生膏, 五通膏, 香螺膏, 天南星草烏膏★
本草	禦風膏, 蛇含膏, 皂角子膏★, 白油麻膏★, 鷹屎白膏★, 百鴿糞膏★, 豹肉脂膏★, 蟾蜍肪膏★, 鼴鼠膏★, 柳枝膏★, 柳葉膏★,白楊樹皮膏★, 柳枝葉膏★, 馬齒莧膏★
丹心	五黃膏, 地黃膏, 辛夷膏, 丹心琥珀膏, 金絲膏, 辰砂膏, 丹心田螺膏, 水澄膏, 丹心麻豆膏, 臙脂膏, 蝎猫膏, 黃連甘草白芷膏★
綱目	雄黃定痛膏, 綱目三聖膏, 綱目熊氷膏, 痔藥膏子, 翠玉膏, 綱目糯米膏, 硝膽膏, 蝎猫膏, 南星地黃膏★, 羊骨髓輕粉膏★, 莫麻子膏★
正傳	正傳神異膏, 綠雲膏, 金寶膏, 百花膏, 必勝膏, 桃仁五倍子白礬膏★
直指	點臀膏, 涌泉膏, 去水膏, 沈水膏, 雄黃膏,紫草膏, 貝母膏
精義	萬應膏, 十香膏, 白龍膏
回春	洪寶膏, 回春蝸牛膏, 秘傳神應膏, 五仙膏, 泥金膏
俗方[387]	楓膏, 臘享膏, 大黃膏, 俗方黃蠟膏, 六香膏
類聚	貼臍膏, 五膽膏, 化瘤膏, 救苦膏
精要	麥飯石膏(精要靈應膏)
局方	局方春雪膏, 神仙太乙膏(太乙膏), 雲母膏, 局方琥珀膏
種杏	外染烏雲膏, 種杏田螺膏, 種杏二生膏

www.kci.go.kr

引用書籍	處方名
海藏	廻生新膏, 代灸塗臍膏, 硝膽膏
寶鑑	浦黃膏, 寶鑑龍腦膏
醫林	醫林龍腦膏, 代灸塗臍膏
三因	蜘蛛輕粉膏✶. 大蒜膏✶
東垣[388]	百點膏
聖惠	十香膏
錢乙[389]	黃栢膏
涓子[390]	乳香膏
袖珍	玉容西施膏(袖珍玉容膏)
御院	辛夷膏
御藥	五黃膏
十三方	麻油豆豉膏✶

이상에서 보는 것처럼 『入門』, 『得效』, 『醫鑑』 등에서 많이 인용하였으며, 단미약으로 膏劑를 만들어 사용한 처방은 『本草』에서 많이 인용하였다.

2) 내복고

內服膏는 한 문헌에서 한두 가지 처방을 인용한 경우가 많아서 外用膏의 경우에 비해 인용문헌의 수가 많았는데, 인용서적별 처방을 분류해 보면 다음과 같다.

표 4. 出典別 內服膏 分類

引用書籍	處方名
入門	入門瓊玉膏, 人蔘膏, 玄霜膏, 血極膏, 芎芷膏, 琥珀犀角膏, 蒲黃杏仁鵬砂膏✶, 萬金一醉膏, 黑膏, 加味蒼朮膏, 蒼朮膏, 轉舌膏, 滋陰淸化膏, 當歸膏, 四汁膏, 加味百花膏, 太乙膏, 雲母膏, 寧神膏, 牛黃膏, 猪乳膏, 辰砂膏, 釣藤膏, 猪尾膏, 猪心龍腦膏
得效	朱砂膏, 一醉膏, 蘿葍膏, 生地黃膏, 善應膏, 蝎猫膏, 大靑膏
醫鑑	玄霜雪梨膏, 坎离膏, 醫鑑血極膏, 旱蓮膏, 白朮膏, 寧嗽膏, 龍鳳膏, 紫草膏
本草	天門冬膏, 枸杞子膏✶, 五味子膏✶, 人蔘膏, 旱蓮膏, 桑椹膏✶, 朮膏✶, 三稜膏, 益母膏, 瓦蘆子膏✶, 竹膏✶
丹心	瓊玉膏, 人蔘膏, 霞天膏, 霞天膏, 牛膝膏, 小淸空膏, 參朮膏, 薄荷膏, 潤肺膏, 藕汁膏, 太乙膏, 雲母膏, 參苓白朮膏, 益母膏, 驅風膏, 寧心膏, 紫河車膏✶
綱目	人蔘膏, 牡蠣膏✶, 葱白膏✶, 參朮膏, 綱目國老膏, 大靑膏, 雄黃膏, 龍腦膏子
正傳	瓊脂膏, 潤腸膏, 花火膏, 龍鳳膏
直指	萬金一醉膏, 乳麝雲母膏
錢氏[391] 錢乙[392]	辟邪膏 大靑膏, 雄黃膏
湯氏	助胃膏
回春	坎离膏, 滋陰淸化膏, 補眞膏, 參朮調元膏, 八仙膏
俗方[393]	寧神膏
諸方[394]	一醉膏
類聚	五膽膏, 荔枝膏
精要	精要國老膏
局方	局方寧志膏, 神仙太乙膏(太乙膏), 雲母膏
衛生方	衛生方瓊玉膏
保命	牛黃膏
海藏	龍腦膏, 猪尾膏
玉機	牛黃膏
醫林	蘿葍膏, 補精膏, 補髓膏,
別方[395]	龍腦膏
東垣[396]	淸空膏
袖珍	水煮木香膏
謙甫[397]	謙甫血極膏, 單大黃膏
飛霞[398]	霞天膏
新書	潤肺膏, 白鳳膏,
大全良方	大全良方寧志膏, 地楡膏✶
醫說	人蔘膏
集驗	靈神膏
活人	猪尾膏, 猪心龍腦膏, 龍腦膏子

387) 이는 書名이 아님. 許浚이 『東醫寶鑑』을 著述하면서 世俗의 處方을 選擇하여 使用하였을 것으로 추정됨.
388) 이는 書名이 아님. 東垣老人인 李杲를 意味하며 李杲의 書籍 中 하나라고 추정됨.
389) 이는 書名이 아님. 북송의 소아과 명의 錢乙이 쓴 『小兒藥證直訣』임.
390) 이는 書名이 아님, 劉涓子의 著書라 추정됨
391) 이는 書名이 아님. 북송의 소아과 명의 錢乙이 쓴 『小兒藥證直訣』임.
392) 이는 書名이 아님. 북송의 소아과 명의 錢乙이 쓴 『小兒藥證直訣』임.
393) 이는 書名이 아님. 許浚이 世俗의 處方을 選擇하여 使用하였을 것으로 추정됨.
394) 이는 書名이 아님. 許浚이 世俗의 處方을 選擇하여 使用하였을 것으로 추정됨.
395) 이는 書名이 아님. 許浚이 世俗의 處方을 選擇하여 使用하였을 것으로 추정됨.

www.kci.go.kr

이상에서 보는 것처럼 『入門』, 『丹心』에서 많이 인용하였으며, 外用膏와 마찬가지로 단미약으로 膏劑를 만든 경우는 『本草』에서 많이 인용되었다.

3. 處方 內容 分析

1) 외용고

(1) 처방명은 있는데 처방내용이 나오지 않는 경우

花草膏는 처방 내용은 『東醫寶鑑』에 수록되어 있지 않은데, 『得效』에는 '治患眼腫痛澀癢 昏淚羞明 羯羊膽一枚 飯上蒸熟 上以冬蜜研和 入朱砂末少許 頻研成膏 食後臨臥 匙抄少許含咽 亦可點目.'[399]이라고 되어있다.

「腰門」의 代灸膏는 처방이 「寒門」에 나온다고 하였으나, 「寒門」에는 代灸膏가 없고 代灸塗臍膏 처방이 수록되어 있는 것으로 보아 두 처방이 同一處方이라고 여겨진다.

(2) 同一 처방명이지만 출전에 따라 처치방법이 다른 경우

御院辛夷膏는 약을 솜에 싸서 콧구멍에 넣어 치료하는데, 丹心辛夷膏는 숨구멍과 콧구멍에 바르며, 醫林代灸塗臍膏는 배꼽위에 약을 붙이고 천으로 싸매어 치료하는데, 海藏代灸塗臍膏는 약을 종이에 발라 관원과 기해혈에 붙인다. 그러므로 처방을 사용할 때 조심해서 써야 할 것이다.

(3) 同一 처방명이지만 출전에 따라 구성약재가 다른 경우

田螺膏, 二生膏, 麻豆膏, 熊氷膏, 神異膏, 琥珀膏, 春雪膏 등은 출전에 따라 구성약물이 다르기 때문에 병증에 맞는 처방을 고르기 위해서는 약물구성을 한 번 더 확인하고 써야 한다.

種杏田螺膏는 田螺, 白礬으로 구성되어 있는데 丹心田螺膏는 田螺, 片腦으로 구성되어 있으며, 種杏二生膏는 生地黃만 사용하는데 醫鑑二生膏에는 生薑이 추가되어 있고 得效二生膏에는 次糝, 木香이 추가되어 있다.

入門麻豆膏는 麻油, 巴豆, 草麻子로 구성되어 있는데 丹心麻豆膏는 獨莖羊蹄根, 白礬, 輕粉, 黃丹으로 구성되어 있다. 入門熊氷膏는 熊膽, 片腦, 白雄鷄膽으로 구성되어 있고 綱目熊氷膏는 雄鷄膽, 片腦로 구성되어 있고 得效熊氷膏(일명 熊膽膏라고도 함)는 熊膽, 片腦로 구성되어 있다.

正傳神異膏는 露蜂房, 杏仁, 黃芪, 蛇退, 玄參, 亂髮로 구성되어 있는데 得效神異膏는 全蝎, 皂角, 巴豆, 蛇床子, 雄黃, 輕粉으로 구성되어 있다.

局方春雪膏는 蕤仁, 龍腦로 구성되어 있는데 得效春雪膏는 鵬砂, 龍腦, 朴硝로 구성되어 있다.

局方琥珀膏는 琥珀, 丁香, 木香, 木通, 桂心, 當歸 등으로 구성되어 있는데 丹心琥珀膏는 大黃, 朴硝, 大蒜으로 구성되어 있으며, 入門琥珀膏는 丹心琥珀膏에 麝香을 추가한 것으로 일명 硝黃膏라 부른다.

(4) 同一 처방명이지만 출전에 따라 주치병증이 다른 경우

처방명은 같지만 출전에 따라 구성약재 뿐 아니라 주치병증도 달라지는 경우가 있다.

回春蝸牛膏는 大小便不通을 치료하는데 入門蝸牛膏는 痔瘡을 치료하며, 醫林龍腦膏는 小兒胎風으로 인한 赤爛을 치료하는데 寶鑑龍腦膏는 卒聾을 치료한다.

綱目三聖膏는 머리털이 빠져 다시 나게 하는데 入門三聖膏는 積塊를 치료하며, 得效黃蠟膏는 手足皸裂를 치료하는데 入門黃蠟膏는 內外臁瘡을 치료하며 俗方黃蠟膏는 새로 살이 나게 하는데 사용한다.

入門糯米膏는 瘡을 치료하는데 綱目糯米膏는 끊긴 筋骨에 새살이 나게 하며, 入門如聖膏는 難産, 乳懸症, 産後陰脫을 치료하는데 得效如聖膏나 丹溪如聖膏는 紫癜白癜을 치료한다.

2) 내복고

(1) 처방명은 있는데 처방내용이 나오지 않는 경우

參苓白朮膏는 처방 내용이 「內傷門」에 나온다고 하였는데 「內傷門」에는 參苓白朮膏가 없고 參苓白朮丸과 參苓白朮散 처방이 수록되어 있다.

396) 이는 書名이 아님. 東垣老人인 李杲를 意味하며 李杲의 書籍 中 하나라고 추정됨.
397) 이는 書名이 아님. 羅天益의 著書 中 하나라고 추정됨
398) 이는 書名이 아님. 飛霞道人인 韓懋을 意味하며 그의 著書라고 추정됨
399) 危亦林. 世醫得效方. 중국중의약출판사. 1996. p.277.

www.kci.go.kr

(2) 同一 처방명이지만 출전에 따라 제조방법이 다른 경우

綱目國老膏는 감초를 심과 찌꺼기를 제거하고 베에 걸러 고약이 되게 달여서 데운 술에 타먹고 精要國老膏는 감초를 물에 담갔다가 천천히 구워 물기가 마르면 다시 담갔다가 굽기를 그 물이 다 없어질 때까지 한 다음 좋은 술에 넣어 절반이 되게 달여 먹었다.

(3) 同一 처방명이지만 출전에 따라 구성약재가 다른 경우

局方寧志膏는 棗仁, 人參, 朱砂, 乳香으로 구성되어 있는데 大全良方寧志膏는 朱砂, 棗仁, 人蔘, 白茯神, 琥珀, 乳香으로 구성되어 있다.

醫鑑血極膏는 大黃, 血竭으로 구성되어 있는데 謙甫血極膏는 大黃으로만 구성되어 있고, 여기에 當歸頭를 추가하면 單大黃膏라 한다.

新書潤肺膏는 羊肺, 杏仁, 柿霜, 眞蛤粉으로 구성되어 있는데 丹心潤肺膏는 紫菀, 杏仁, 款冬花, 麻黃, 桔梗, 細辛, 訶子 등으로 구성되어 있다.

4. 처방명을 명명한 것

膏를 만들어 사용하기는 하였지만 처방에 대한 이름이 없는 경우는 구성약재명을 이용하여 처방명을 명명하였다. 처방명을 명명하는 원칙으로는 한 가지 약재를 사용한 경우는 약재이름 뒤에 '膏'字를 붙여 명명하였고, 두 가지 약재를 사용한 경우는 두 가지 약재이름을 병기한 다음 그 뒤에 '膏'字를 붙여 명명하였고, 세 가지 약재를 사용한 경우는 세 가지 약재이름을 병기한 다음 그 뒤에 '膏'字를 붙여 명명하였다.

1) 외용고

위와 같은 방법으로 처방이름을 새롭게 부여한 外用膏 처방은 모두 29개이다. 단미 처방이 많아서 『本草』를 출전으로 한 처방이 가장 많았는데, 출전별로 분류하면 다음과 같다.

표 5. 새로 명명한 外用膏

出典	處方名
三因	蜘蛛輕粉膏✶, 大蒜膏✶
得效	地黃大黃膏✶, 猪膽龍腦膏✶, 皂角草烏膏✶
本草	柳枝葉膏✶, 白油麻膏✶, 鷹屎白膏✶, 百鴿糞膏✶, 豹肉脂膏✶, 蟾蜍紐方膏✶, 鼴鼠膏✶, 柳枝膏✶, 柳葉膏✶, 皂角子膏✶, 白楊樹皮膏✶, 馬齒莧膏✶
醫鑑	天南星草烏膏✶
綱目	南星地黃膏✶, 草麻子膏✶, 羊骨髓輕粉膏✶
正傳	桃仁五倍子白礬膏✶
入門	皂角膏✶, 驢蹄蕎麥草烏膏✶, 杏仁乳香硫黃膏✶, 芥子膏✶, 黃丹膏✶
丹心	黃連甘草白芷膏✶
十三方	麻油豆豉膏✶

2) 내복고

처방이름을 새롭게 부여한 內服膏 처방은 모두 12개인데, 內服膏 또한 단미 처방이 많아서 『本草』를 출전으로 한 처방이 가장 많았는데, 출전별로 분류하면 다음과 같다.

표 6. 새로 명명한 內服膏

出典	處方名
本草	枸杞子膏✶, 五味子膏✶, 朮膏✶, 桑椹膏✶, 紫河車膏✶, 瓦壟子膏✶, 竹膏✶
良方	地楡膏✶,
綱目	牡蠣膏✶, 葱白膏✶
入門	蒲黃杏仁鵬砂膏✶,
丹心	薄荷膏✶,

5. 사용 약재 분석

膏劑를 만드는데 사용된 약재는 크게 膏劑 처방을 구성하는 약재와 膏를 만드는데 사용된 기초제로 구분할 수 있다. 膏를 만드는데 사용된 기초제로는 蜜, 黃蠟, 薑汁, 生地黃汁, 唾, 茶, 醋, 人乳, 牛乳, 黃牛膽汁, 葱涎, 砂糖 뿐만 아니라 鴈油, 猪脂 등과 같은 動物性油, 麻油, 杏仁油와 같은 植物性油 등 다양한 종류의 형태를 사용한다.

www.kci.go.kr

1) 외용고

外用膏를 만드는데 사용된 약재 가운데 白蠟은 주로 아물게 하고 단단히 엉키는 힘을 가지고 있어서 外科에 좋은 약으로 쓰이고 黃蠟은 쇠붙이에 상한 것을 치료하며, 輕粉, 大風子, 密陀僧, 信砒, 硫黃 등은 임상에서 外用을 위주로 응용되는 약물로써 內服도 가능하지만 실제로 응용하는 경우는 비교적 적고 外用時에도 過量을 사용하지 않도록 신중을 기해야 한다. 이상 약재들은 모두 外用膏에만 사용되었고 內服膏에는 사용되지 않았다. 또한 外用膏를 만드는 기초제로는 주로 植物油나 동물의 기름이 사용되었다.

外用膏를 만드는데 사용된 약재들을 구분해 보면 다음과 같다.

(1) 식물성 약재

식물성 약재로는 淸熱, 解毒, 止血, 止痛, 活血, 補血 등의 효능을 가진 것이 쓰였고 麻油, 薑, 生地黃, 醋, 茶, 麵, 白糕, 杏仁, 葱, 甘遂, 甘松, 甘草, 桂, 芥子, 苦參, 瓜蔞, 藿香, 蕎麥, 菊莖葉, 芎藭, 桔梗, 槐潤, 槐枝, 糯米, 蘿葍子, 蘆薈, 菉豆, 漏蘆, 丹參, 當歸, 大蒜, 大黃, 大風子, 桐油, 桃仁, 柳枝, 馬藺子, 馬齒莧, 蔓荊子, 木通, 木香, 沒藥, 蕪荑, 半夏, 防風, 白膠香, 白芨, 白檀, 白斂, 白薇, 白丁香, 白芷, 檳榔, 白楊樹, 白芍藥, 茯苓, 附子, 萆麻子, 桑白皮, 蛇床子, 山梔, 商陸根, 桑柴灰, 鼠粘子, 蘇合油, 柴胡, 乾地黃, 細辛, 水紅花子, 藜蘆, 臙脂, 零陵香, 吳茱萸, 牛膝, 鬱金, 龍腦, 蕤仁, 乳香, 松脂, 辛夷, 五倍子, 王瓜藤, 天南星, 血竭 등이 사용되었다.

(2) 동물성 약재

동물성 약재로는 斑猫와 같이 독성이 강해 外用로 주로 쓰이며 癰疽, 惡瘡 등에 효능이 있는 것이 쓰였으며 唾, 猪油, 人乳, 牛乳, 鴈油, 豹脂, 露蜂房, 烏鷄脂, 黃牛膽汁, 鮮魚血, 猾羊膽, 鷄子黃, 蚯蚓糞, 鹿角, 蜘蛛, 驢蹄肉, 鯉魚膽, 牡蠣, 斑猫, 白蜜, 白蠟, 白雄鷄膽汁, 白殭蠶, 白鴿糞, 蛇退, 麝香, 蟬殼, 蟾酥, 羊骨髓, 羊糞, 羊髓, 鼴鼠, 烏鷄膽, 龍骨, 龍齒, 蝸牛, 牛黃, 熊膽, 雄黃, 油髮, 亂髮, 黃蠟 등이 사용되었다.

(3) 광물성 약재

광물성 약재로는 水銀, 密陀僧, 信砒 등의 외용약이 쓰였으며 空靑, 光粉, 銅綠, 銅錢, 朴硝, 膽礬, 密陀僧, 白礬, 石膏, 石灰, 信砒, 鹽, 焰硝, 鹽花, 雲母, 水銀, 朱砂, 黃丹, 輕粉, 硫黃, 琥珀 등이 사용되었다.

2) 내복고

內服膏를 만드는데 사용된 약재 가운데 黃丹은 鉛丹이라고도 하며 주로 外用으로 散·丹·膏劑 중에 배합되어 쓰이고 內服으로 사용시에는 독성이 있기 때문에 少量만 사용해야 한다.

內服膏를 만드는데 사용된 약재들을 구분해 보면 다음과 같다.

(1) 식물성 약재

식물성 약재로는 止痛, 淸熱, 瀉火, 消痰 등의 효능을 가진 것 이외에 人參과 같이 補氣 效能이 있는 것, 또 補陰, 補血, 止咳, 寧心 效能이 있는 것들이 사용되었다.

茄子, 甘蔗, 甘草, 薑, 降眞香, 羌活, 薑黃, 芡仁, 藿香, 款冬花, 枸杞子, 貴箭羽草, 桔梗, 蘿葍子, 當歸, 獨莖羊蹄, 大黃, 大風子, 桃仁, 杜冲, 龍腦, 麻油, 麻黃, 麥門冬, 茅根汁, 牧丹皮, 木香, 沒藥, 牡蠣, 木鱉子肉, 薄荷, 半夏麴, 防風, 白果汁, 白膠香, 白豆蔻, 白茅根汁, 白茯苓, 白茯神, 百部, 白附子, 白芍藥, 白芷, 白朮, 白合, 茯神, 山藥, 酸棗仁, 桑椹, 砂糖, 生地黃, 乾地黃, 熟地黃, 雪梨, 生梨, 生藕汁, 石蒼蒲, 細辛, 蘇木, 豉, 柴胡, 沈香, 蓮肉, 烏梅, 五味子, 牛膝, 遠志, 威靈仙, 乳糖, 乳香, 肉荳蔻, 薏苡仁, 茺蔚, 人蔘, 飴糖, 紫草, 紫菀, 赤茯苓, 丁香, 棗肉, 竹瀝, 地骨皮, 知母, 枳實, 地楡, 蒼朮, 川椒, 川烏, 天門冬, 川芎, 天竺黃, 靑黛, 靑皮, 草龍膽, 草烏, 葱白, 縮砂, 側柏葉, 梔子, 沈香, 破古紙, 蒲黃, 何首烏, 旱蓮草, 杏仁, 玄蔘, 胡桃肉, 黃連, 黃瓜蔞, 黃芩, 黃芪, 黃栢, 厚朴, 黑椹, 柿霜, 皂角, 血竭 등이 사용되었다.

(2) 동물성 약재

동물성 약재로는 婦人胞衣, 犀角과 같이 補氣, 養血 效能을 가진 약재 외에도 安身, 活血 效能을 가진 약재가

www.kci.go.kr

사용되었으며, 蝎梢, 童尿, 鹿角膠, 鯉魚膽, 白蜜, 白殭蠶, 蜂蜜, 婦人胞衣, 麝香, 犀角, 蟾酥, 酥油, 阿膠, 羊肺, 烏鷄, 烏蛇肉, 生乳汁, 牛黃, 熊膽, 雄牛前脚髓, 雄黃, 猪脂, 猪尾血, 猪心血, 全蝎, 地龍, 蜘蛛, 眞酥, 眞蛤粉, 穿山甲, 靑羊膽, 虎頭骨, 黃犍牛前脚髓, 黃牛, 黑觜白鴨, 蚶殼 등이 사용되었다.

(3) 광물성 약재

광물성 약재로는 安心活血 效能이 있는 琥珀 등이 사용되었는데 外用膏에 비해 종류가 적다. 馬牙草, 白礬, 鵬砂, 焰硝, 雲母, 朱砂, 辰砂, 靑鹽, 貝母, 寒水石, 玄明粉, 琥珀, 黃丹 등이 사용되었다.

6. 膏劑 제조 방법

膏는 장기 보관이 용이하고 만들어 놓으면 쓰기에 간편하고 경제적이다. 『東醫寶鑑』에서는 膏를 만드는 방법이 어떻게 쓰였는지를 알아보고 현대의 일반적인 膏劑 제법과 비교해 보았다.

1) 외용고

外用膏를 만드는 방법을 분류해 보면 아래와 같이 8개의 방법이 쓰였다.

① 유동성 물질에 가루형태의 약재를 넣어 갠다.

② 짓찧는다.

③ 유동성 물질을 불에 녹이면서 분말형태의 약재를 넣어 잘 반죽한다.

④ 약재를 유동성 물질에 넣고 졸이다가 찌꺼기는 버리고 蜂蜜 등을 넣어 다시 졸인다.

⑤ 약재를 유동성 물질에 넣고 졸여 고약을 만들어 식힌 다음에 麝香, 龍腦 등을 넣는다.

⑥ 약재를 유동성 물질에 넣고 졸인다.

⑦ 약재를 유동성 물질에 넣고 졸이다가 약재를 꺼내고 黃蠟 등을 넣어 녹여 식힌다. 여기다 다른 약재를 넣어 반죽해서 고약을 만든다.

⑧ 약재를 유동성 물질에 넣고 졸이다가 찌꺼기를 버리고 黃丹을 넣고 약한 불에 졸이다가 물에 떨구어 보아 구슬같이 되어 풀어지지 않을 때 乳香, 沒藥 등을 넣어 잘 젓는다.

위와 같이 外用膏를 만드는 방법이 현대의 外用膏 제조 방법과 크게 차이를 보이지 않았다.

2) 내복고

內服膏를 만드는 방법을 분류해 보면 아래와 같이 5개의 방법이 쓰였다.

① 약들을 가루내어 密, 猪脂, 砂糖등으로 반죽한 다음 알약을 만든다.

② 즙을 내어 은그릇이나 돌그릇에 넣고 달여 고약을 만든다.

③ 약물을 절반이 되게 달인 다음 걸러서 찌꺼기를 버린다. 여기에 젖당등을 넣고 달여 녹인 다음 생강즙을 넣고 다시 달인다. 다음 麝香을 넣고 고루 젓는다.

④ 약물을 달여 3-4사발이 되면 찌꺼기를 버리고 그 물에 약재를 넣고 다시 물을 더 부은 다음 달여 짜서 찌꺼기는 찰지게 짓찧어 따로 물 1-2사발에 넣고 달여 짠다. 이것을 이미 달인 약물과 함께 섞는다. 이런 식으로 찌꺼기가 다 없어질 때까지 반복한다. 이 물과 蜂蜜, 앞의 약물과 함께 섞어서 달여 고약을 만든다. 이것을 물에 담가 두고 화독(火毒)을 뺀다.

⑤ 霞天膏와 같이 동물의 고기를 약재로 할 경우에는 푹 삶아 약재를 섞은 뒤 膏를 만들거나 오계의 알 1개에 작은 구멍을 뚫고 산 지룡(작은 것) 한 마리를 그 속에 넣어 쪄서 膏를 만든다.

위와 같이 內服膏를 만드는 방법은 현대의 內服膏를 만드는 일반적인 방법과 다르지 않다. 현대의 內服膏 제조방법은 처방에서 별도로 규정하지 않으면 약물을 2~3 차례 水煎煮하는데 매회 煎煮할 때마다 여과하여 농축해서 淸膏를 만드는 것이다.[400]

400) 신민교. 임상본초학. 영림사. 서울. 2002. p.119

www.kci.go.kr

7. 처치방법 분석

1) 외용고

外用膏에 대한 처치방법은 入, 點, 塞, 塗, 塗擦, 掃, 擦, 抹, 封, 付, 敷, 貼의 방법으로 표현하고 있다.

많이 쓰는 처치방법은 貼, 付와 같이 붙이는 방법인데, 천이나 종이에 발라 붙이거나 그냥 붙이기도 하고 塗, 塗擦, 搽와 같이 患處에 손으로 펴 바르기도 하였으며 깃털에 묻혀 바르기도 하였다.

하루에 여러 번 갈아 붙이는데 효과가 있을 때까지 붙여두기도 하였으며 약효가 강할 때는 붙이자마자 바로 떼어내야 하는 경우도 있었다.

膏를 시술하는 부위는 患處 외에도 다양한 부위에 시술하였다.

眼疾患에는 주로 눈에 點眼하는 방법이 많이 쓰였고, 鼻塞이나 卒聾과 같은 병증에는 조그맣게 약을 떼어 뭉치거나 솜에 약을 묻혀 코나 귀에 삽입하기도 하였다. 衄血을 치료하는 洪寶膏는 코가 아니라 뒷머리위에 붙이기도 하였다. 눈에 넣을 때는 細末하여 물, 침, 香油 등에 개어 넣었다.

남녀에 따라 붙이는 부위를 다르게 하기도 하였는데 廻生新膏를 男子인 경우는 음낭에 붙이고 여자인 경우는 가슴에 붙인 이유는 그곳이 남녀의 근본이며 坎离에 속하기 때문이라 하였다.

如聖膏는 乳懸證을 치료할 때에 정수리에 붙이고 難産, 死胎不下를 치료할 때는 배꼽에 붙이거나 오른쪽 발바닥에 붙이는데, 해산을 하면 바로 씻어 버려야지 아니면 자궁탈출까지 생길 수 있다고 하였다. 자궁탈출이 생겼을 때는 산모의 정수리에 如聖膏를 붙이면 자궁이 저절로 들어간다고 하였다.

머리를 염색할 때는 外染烏雲膏를 머리털에 바르고 하룻밤 싸매두었다가 이튿날 아침에 씻어 버린다.

위와 같이 外用으로 쓰이는 膏는 눈에 넣거나 피부에 펴 바르기도 하고 배지에 발라 患處에 붙이거나 떡이나 약 심지를 만들어 붙이기도 하고 구멍에 투입하기도 하고 膏를 붙이고 천으로 싸매는 등 여러 가지 방법으로 다양한 부위에서 시술하였다.

2) 내복고

內服膏를 복용하는 방법을 분류해 보면 다음과 같다.

① 溫酒調服(더운 술과 함께 먹는다.)
補精膏, 雲母膏와 같이 丸을 만들어 먹거나 숟가락으로 떠먹을 때에 따뜻한 술과 함께 먹기도 하고,[401] 紫草膏와 같이 좋은 술을 뜨겁게 해서 먹기도 하였다.[402] 益母膏처럼 술을 못 먹을때는 白湯으로 대신하기도 하였다.[403]

② 酒服(술과 함께 먹는다.)
天門冬膏와 같이 술과 함께 먹기도 하였다.[404]

③ 白湯調服(끓인 물과 함께 먹는다.)
五味子膏, 當歸膏와 같이 끓인 물과 함께 약을 먹었는데[405] 白湯이 아니고 溫水나 깨끗한 물(井華水)과 같이 먹기도 하였다.[406]

④ 약재를 달인 물과 함께 먹는다.
朱砂膏와 같이 약을 가루로 만들거나 轉舌膏와 같이 약을 丸으로 만들어, 天門冬과 같은 약재를 넣고 끓인 물과 함께 먹기도 하였다.[407]

⑤ 膏를 바로 떠먹거나 입안에 머금어서 녹여 먹기도 하고[408] 霞天膏, 龍鳳膏와 같은 약은 동물의 肉을 膏처럼 만들어 먹기도 하였다.

⑥ 약을 먹는 때와 상태는 다양한데 빈속에 먹거나 잠들기 전에 먹거나 때를 정하지 않고 아무 때나 먹는 수도 있고 먹는 양과 기간은 다양하다.

---

401) 每一匙溫酒調服(補精膏), 作丸梧子大溫酒呑下三十丸(雲母膏)
402) 好酒化熱服(紫草膏)
403) 每取一大匙溫酒或白湯化下(益母膏)
404) 酒服一二匙(天門冬膏)
405) 每取一二匙空心白湯調服(五味子膏), 每取二茶匙空心白湯調下(當歸膏)
406) 每服一丸井華水化下(龍腦膏者)
407) 末每二錢麥門冬湯調下(朱砂膏), 每一丸薄荷湯化下(轉舌膏)
408) 日服五六匙(人蔘膏), 如彈子大每一丸臨臥含化嚥下(玄霜膏)

www.kci.go.kr

8. 外用과 內服을 겸한 처방

한 가지 처방이 外用과 內服을 겸하고 있는 처방들이 있는데 다음과 같다.

神仙太乙膏(太乙膏), 善應膏, 雲母膏는 「雜方門」에 처방내용이 나오는데 內服과 外用으로 모두 쓰인다고 하였고 五膽膏는 식후에 데운 술에 먹고 나서 조금 떼어서 눈에 넣는다고 하였다.

黃丹은 주로 外用에 쓰이는데 內·外用을 겸하는 神仙太乙膏(太乙膏), 善應膏, 雲母膏을 제외하고는 內服으로 쓰이는 처방약재에 나타나지 않는다.

9. 출전에 따라 外用과 內服이 다른 처방

처방은 同一하지만 출전에 따라 內服과 外用이 다른 경우가 있다.

入門辰砂膏는 內服으로 쓰이는데 丹心辰砂膏는 外用으로 쓰이며, 別方龍腦膏는 內服으로 쓰이는데 醫林龍腦膏와 寶鑑龍腦膏는 外用으로 쓰이고, 得效蝎猫膏는 內服으로 쓰이는데 綱目蝎猫膏는 外用으로 쓰인다.

10. 처방명은 膏이지만 形態는 丸인 처방

약의 形態는 丸이지만 膏라는 처방명을 가진 것들이 있는데 정리하면 다음과 같이 27개가 있다.

표 7. 丸으로 쓰인 名膏 처방

區分	處方名
外用膏	辛夷膏, 雄黃定痛膏, 蜘蛛膏★, 磨風膏
內服膏	局方寧志膏, 玄霜膏, 謙甫血極膏, 醫鑑血極膏, 牡蠣膏★, 芎芷膏, 琥珀犀角膏, 龍腦膏, 轉舌膏, 滋陰淸化膏, 乳麝雲母膏, 寧神膏, 牛黃膏, 磨風膏, 寧心膏, 露星膏, 助胃膏, 猪尾膏, 紫草膏, 龍腦膏子, 太乙膏, 雲母膏, 善應膏

辛夷膏, 雲母膏, 芎芷膏 등은 丸의 형태로 만들어 外用하거나 內服하는 처방들인데, 內服할 경우는 주로 蜜丸으로 만들어서 溫酒, 白湯이나 약재 끓인 물과 복용하였다. 內·外用겸용으로 쓰이는 太乙膏, 雲母膏, 善應膏는 內服時에는 丸으로 만들어 복용하였다.

Ⅴ. 결 론

『東醫寶鑑』에 나오는 膏劑의 처방을 분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 外用膏는 주로 外科·皮膚科疾患이나 腎膜, 耳聾 등의 五官科疾患을 치료하는데 사용되었다. 外用膏라 하여 外科疾患에만 사용된 것이 아니라 大小便不通, 痢疾, 惡寒 등과 같은 內科疾患을 치료하는데 쓰이기도 하였으며, 아이가 젖을 끊게 하거나 머리털 染色 등에도 다양하게 쓰였다. 內服膏는 生精補氣, 咳嗽, 勞瘵등의 內科疾患에 주로 쓰였고 皮膚科, 婦人科, 小兒科와 驚悸, 癲狂 등의 神經精神科疾患에도 쓰였다.

2. 外用膏는 총 27종의 서적에서 처방을 인용되었는데, 『入門』, 『得效』, 『醫鑑』등에서 많이 인용하였고, 內服膏는 31종의 서적에서 인용되었는데, 『入門』, 『丹心』 등에서 주로 인용되었다. 外·內服 모두 단미약으로 膏劑를 만든 처방은 『本草』에서 가장 많이 인용되었다.

3. 花草膏, 參苓白朮膏와 같이 처방명만 나오고 처방내용이 나오지 않는 경우도 있고, 처방명은 同一하지만 각 출전에 따라 구성약재나 적응 병증, 처치방법이 달라지는 경우가 內·外用 膏劑에서 모두 있으며 이런 경우에는 同一 처방이라 볼 수 없었다.

4. 처방명이 없는 경우에는 구성 약물의 이름을 가지고 새롭게 명명하였다. 外用膏에서는 총 29개, 內服膏에서는 총 12개가 명명되었다.

5. 外用이나 內服膏를 만드는데 사용된 약재는 크게 주 약재와 膏劑를 만드는데 사용된 기초제로 구분할 수 있다. 蜜, 生地黃汁, 唾, 醋, 砂糖 등 뿐만 아니라 鴈油, 猪脂 등 같은 動物性油와 麻油, 杏仁油와 같은 植物性油를 기초제로 하여 다른 약재와 섞어 膏劑를 만들었다.

www.kci.go.kr

輕粉, 大風子, 密陀僧, 信砒, 硫黃 등은 內服膏에는 사용되지 않고 外用膏에만 사용되었다.

6. 膏劑를 만드는 방법은 간단하게 찧거나 분말을 기름이나 즙에 개어 만드는 방법과 약재를 여러 차례 끓이다가 蜂蜜이나 黃蠟등을 넣어 만들었다. 外用膏는 약재를 넣어 가열할 때 植物性油나 動物性油을 가지고 사용하였으나 內服膏는 약재를 주로 물에 넣어 가열하여 사용하였으며 이와 같은 방법은 현재에까지 별반 다르지 않게 쓰이고 있다.

7. 外用膏는 貼, 敷, 擦, 塗, 點, 入 등의 방법으로 患處에 펴바르거나 또는 눈에 넣거나 구멍에 넣어 사용되어 졌고 內服膏는 溫酒, 白湯, 약재를 달인 물과 함께 먹거나 膏를 그냥 떠먹기도 하였고 먹는 양과 시기는 다양하였다.

8. 神仙太乙膏(太乙膏), 善應膏, 雲母膏, 五膽膏는 같은 처방내용으로 外用과 內服으로 모두 쓰이나 辰砂膏, 龍腦膏, 蝎猫膏는 外用과 內服으로 쓰이지만 처방내용은 다르다.

9. 辛夷膏, 雲母膏, 芎芷膏등 27개는 약의 形態는 丸이지만 처방명은 膏로써 內服시에는 주로 蜜丸으로 만들어 복용하였다.

Ⅵ. 참 고 문 헌

1. 동의문헌연구실 譯. 新對譯東醫寶鑑. 법인문화사. 서울. 2007.
2. 신민교. 臨床本草學. 영지사. 서울. 1991.
3. 신광호. 韓醫外治療法學. 대성의학사. 서울. 2000.
4. 신광호, 韓方外用藥. 1994. 열린 책들. 서울. 1994.
5. 정명용, 김은배, 안상우, 이병욱. 理淪騈文의 학술사상에 관한 연구(1). 한국의사학회지. 제18권 1호. 2005. pp.65-88.
6. 이은숙, 서부일, 이준우, 배진숭. 瓊玉膏 및 瓊玉膏加味方이 폐암에 미치는 영향. 대한본초학회지. 제17권 2호. 2002. pp.101-109.
7. 오철, 김호현, 고흥. 청공고의 내피세포 의존성 혈관이완효과. 동의생리병리학회지. 제22권 3호. 2008.
8. 최영철, 오태환, 정승기, 이형구. 윤폐고 및 자소반하탕가미방의 효능에 관한 실험적 연구. 경희대학교 한의과대학 논문집. 제15권 1호. 2007.
9. 이진아 외2인. 點眼藥에 대한 문헌적 고찰. 한방안이비인후피부과학회지 제6권 1호. 1993. pp.155-170.
10. 이병욱 외4인. 千金要方에 기재된 藥浴療法에 관한 연구. 대한한의학원전학회지 제17권 1호. 2004. pp.198-217.
11. 신상문 외1인. 外科疾患에 상용하는 膏藥의 처방내용에 대한 고찰. 대한안이비인후피부과학회지 제7권 1호. 1994. pp.95-122.
12. 박태열, 고우신. 馬王堆醫書, 黃帝內經, 金匱要略에 나타난 중국 고대 外治療法. 동의생리병리학회지 제16권 4호. 2002. pp.63-89.
13. 문우상, 김은하, 이병욱. 魏晉시대의 外治療法에 관한 연구. 대한한의학원전학회지 제18권 3호. 2005. pp.70-80.
14. 문우상, 이병욱, 안상우, 김은하. 外治療法의 이론과 적응증에 대한 사적 고찰. 한국한의학연구원논문집 제10권 2호. 2004. pp.1-21.

www.kci.go.kr