

「傷寒論」과 「金匱要略」에 수록된 錢匕의 의미

김연섭 · 김인락*

경원대학교 韓醫科大學 經穴學教室 · 東義대학교 韓醫科大學 本草學教室

The meaning of Qian bi(錢匕) in Shang Han Lun(傷寒論) and Jin Kui Yao Lue(金匱要略)

To judge whether Qian bi(錢匕) among the expressions related to the dose in the prescriptions contained in Shang Han Lun(傷寒論) and Jin Kui Yao Lue(金匱要略) means the amount or the weight, the contents about decoction and powder was put in order and the common criteria determining the dose was induced to obtain the following results.

- 1) Among the 4 measuring units of powder, Fangcunbi(方寸匕), Size of Jujube(大棗大) and Yalk of Egg(鷄子黃大) mean volume.
- 2) Ingestion by Fangcunbi is for the non-toxic case and by Qian bi is for the toxic case. Zhizhusan(蜘蛛散) among Fangcunbi for the toxic case must be taken 1/8 of the ordinary volume. And the metal among Qianbi for the serious toxic case must be taken 1/2 of the volume of the plants.
- 3) In Decoction or Pills by Qianbi the dose for the severe toxic case is one Qianbi and ordinary dose is 4 or 5 Qianbi.
- 4) The measuring unit for Liquid and Small Pills is Sheng(升) representing the volume. The measuring unit of powder or size of Madou(麻豆大) is less than Small Pills.
- 5) The least measuring unit of constituent herbs in decoction is one Liang(兩) and 1/2 of Liang is only used for the increase or decrease except in Mahuangshengmatang(麻黃升麻湯). Therefore Qianbi cannot be acknowledged as 1/10 of Liang.

According to the results mentioned above, the measuring unit of Fangcunbi, Size of Date and Yalk of Egg is volumetric. Since the dose for the toxic case is small. The herbs of small pills is measured by the volume, Qianbi is the wrong letter of the Qianshang(錢上) as the measuring unit of volume and has the theory that Qianbi is the amount of lifted with one side of five Zhu qian(五銖錢).

I. 緒論

한약의 약효를 표준화하려면 약재 하나하나의 약효표준화뿐만 아니라 1회 복용량, 복용회수, 전탕방법 등의 표준화도 필요하다. 張仲景의 傷寒論과 金匱要略에서는 처방마다 이런 내용을 상세히 기술했지만, 용량의 경우 현대 도량형으로 환산하는데 학자들간에 이견이 있어 실제응용에 혼란을 유발한다.

湯劑에서 널리 사용하는 1兩의 경우 長澤元夫¹⁾는 역대제가의 說중 吉益東洞과 尾兌榕堂이 0.94g이라 한 것이 가장 적고, 張介賓이 22.38g이라 한 것이 가장 많다고 정리하고, 아울러 黃帝內經靈樞의 腸胃篇에서 혀의 무게를 10兩이라 한 것에 착안하여 30세 이상 남자屍身の 혀끝에서 舌舐厭주름까지 무게를 실측한 뒤 1兩은 6~7g이라 결론내린 바 있다.

김도 桂枝湯에서 桂枝去皮, 芍藥, 生薑이 3兩이고 炙甘草만 2兩이므로 대추12개도 씨앗을 제거하면 3兩에 해당한다고 가정하여 1兩을 6g으로²⁾ 추정하고, 방법을 달리하여 小柴胡湯의 1/3이 柴胡加芒硝湯인 것과 반하가 소시호탕에서는 반승, 시호가망초탕에서는 5銖 또는 15개인 것에 근거하여 1兩을 6.5g³⁾으로 추정하였다.

錢匕에 대해서는 무게로 보는 설과⁴⁾, 부피로 보는 說이 있으며, 후자에는 錢匕의 匕가 上의 誤字이며 錢上은 五銖錢의 五자가 세겨진 변으로 쓰는 것이란 說과^{5,6)}, 五銖錢으로 약이 떨어지지 않을 정도로 쓰는 것이란 설⁷⁾이 있다. 五銖錢은 漢 武帝5년(BC. 118년)에 만들어져서 730여년간 사용되다가 唐 高祖4년(621년)에 開元通寶錢을 만들면서 사용이 중지되었다⁸⁾, 지름은 2.41cm이고⁹⁾ 가운데 구멍은 정사각형으로 한번은 지름의 4/10 정도⁸⁾이므로 현행 100원 동전보다는

크고 500원보다는 작다.

그러므로 錢匕가 현대의 도량형으로 얼마나 되는지를 결정하기에 앞서 먼저 무게단위인지 부피단위인지를 확정하여야 한다. 이에 저자는 상한론과 금궤요략에 수록된 湯劑와 散劑와 丸劑에서 복용량을 결정하는 공통된 기준을 도출하고, 이 기준에서 錢匕의 의미를 추정할 단서를 얻었기에 보고하는 바이다.

II. 本論

1. 중경방 산제의 용량단위

傷寒論¹⁰⁾의 散劑는 瓜蒂散, 蚊蛤散, 燒裨散, 五苓散, 猪苓散, 回逆散 등 6개이다. 金匱要略¹¹⁾의 散劑는 32개인데 傷寒論과 중복되는 것은 瓜蒂散, 蚊蛤散, 五苓散, 猪苓散 등 4개이므로 仲景方에는 산제가 모두 34개이다. 1일 복용량은 5가지로서 方寸匕, 錢匕, 대추크기, 鷄子黃크기, 그리고 언급이 없는 경우이다.

方寸匕로 표현한 처방은 상한론에 5개, 금궤요략에 24개이며, 문합산, 오령산, 저령산이 중복되므로 중경방에는 모두 26개이며, 중경방 34개 산제중 가장 많은 비중을 차지한다(표1-1,1-2.). 이중 蜘蛛散만은 1/8 방촌비이고 나머지는 모두 1방촌비이다. 복용방법은 薏苡附子敗醬散만이 물 2升으로 달여 1升을 만들어 단번에 복용하며, 나머지는 모두 분말로 복용한다.

錢匕로 표현한 것은 상한론에 瓜蒂散, 금궤요략에 瓜蒂散, 桔梗白散, 白朮散, 天雄散, 蜀漆散이 있으며, 과체산이 중복되므로 중경방에는 5개가 수록되어있다(표2.). 이중 1錢匕는 瓜蒂散과 外臺白朮散이고, 半錢匕는 桔梗白散, 天雄散, 蜀漆散이다.

대추알크기는 질내에 삼입하는 蛇床子散이다.

鷄子黃크기는 排膿散인데 枳實 16개와 芍藥을 지실의 60%, 桔梗을 지실의 20% 만큼 섞고 가루낸 뒤 달걀노른자 크기만큼 취하고 이를 달걀노른자 1개와 섞고 물로 복용한다.

언금이 없는 것으로는 訶梨勒散이 있는데 이는 4. 가리치산의 용량추정에서 다시 논한다.

산제의 용량을 측정하는 단위중 방촌비, 대추알크기, 달걀노른자크기는 모두 부피를 나타내는 것이므로, 1錢匕도 부피를 나타내는 것일 가능성이 크다.

2. 方寸匕와 錢匕의 용량비교

方寸匕로 표현한 것중 蜘蛛散의 용량이 다른 것의 1/8인 까닭은 蜘蛛가 有毒하기 때문으로 추정된다. 頭風摩散의 大附子가 독성이 있지만 두풍마산은 내복약이 아니라 외용약이다. 그리고 薏苡附子敗醬散과 薏苡附子散에도 附子가 있지만, 탕제에서 1일분이 적게는 1개 많게는 3개인 것에 비하면 용량이 매우 적다. 半夏乾薑散의 半夏용량도 중경방에서 半夏의 1일 용량이 대부분 半升이며 무게로는 2兩半에 해당하고 보통의 크기로 15개 정도인 것에 비하면 매우 적다³⁾. 그리고 土瓜根散의 蟪蟲이 유독하지만 中國藥典¹⁰⁾에서 1일 용량이 4-12g이나 되는 것에 비하면 적은 수준이다.

錢匕로 표현한 것중 과체산의 瓜蒂, 길경백산의 巴豆, 백출산의 蜀椒는 식물성이고, 천웅산의 天雄, 촉철산의 雲母는 광물성이다. 과체, 파두, 천웅, 운모가 모두 유독하고, 蜀椒는 복용대상자가 妊娠婦이므로 다른 4종의 약재와 더불어 유독성이 인정된다. 그리고 파두가 든 길경백산이 식물성으로 1회용량이 半錢이기는 하지만, 과체와 촉초가 든 처방은 1회용량이 1錢匕이고, 천웅과 운모는 半錢인데, 광물성약이 식물성약보다 더 유독하기 때

문으로 추정된다.

이처럼 복용량을 方寸匕나 錢匕로 표현한 것에서도 독성의 유무나 강약에 따라 용량이 각각 8배와 2배로 차이가 난다. 이로 미루어 본다면 蜘蛛散의 蜘蛛를 제외하고는 方寸匕로 복용하는 처방의 약재는 무독하고, 錢匕로 복용하는 것은 유독하므로, 錢匕가 方寸匕보다 용량이 적은 것으로 추정할 수 있다. 陶弘景은 方寸匕의 분량에 대하여 산제를 蜜丸했을 때 梧子の 10개정도이고, 梧子 1개는 大豆 2개정도라 하였다⁶⁾. 이를 만족하려면 전비는 방촌비처럼 부피단위이고, 오수전의 동전전체로 약을 뜬다는 설보다는 한번만으로 뜬다는 설이 더 타당성을 지닌다.

3. 탕제나 환제에서 1회량인 錢匕인 것

중경방에서 散劑는 아니면서 복용량이 錢匕로 표현된 처방은 상한론에 3개, 금궤요락에 6개가 수록되었는데 중복되는 것은 십조탕이므로 중경방에서는 모두 7개가 된다(표3.)

1錢匕를 복용하는 경우는 大陷胸湯, 大陷胸丸, 十棗湯 3개이다. 대함흉탕은 大黃과 芒硝를 달인 것으로 甘遂末 1錢匕를 복용하며, 大陷胸丸은 大黃, 葶藶子, 杏仁, 芒硝로 환을 짓고 이를 전탕한 것으로 甘遂末 1錢匕를 복용하며, 十棗湯은 대추 큰 것 10개 달인 물로 甘遂, 大戟, 芫花末 1錢匕를 복용한다. 따라서 이들에서 1錢匕를 복용하는 약재는 甘遂, 大戟, 芫花이며 모두 散劑이다.

4錢匕 또는 5錢匕를 복용하는 경우는 약재를 剉하여 麻豆크기로 한 것을 전탕하므로 湯劑가 된다. 이는 상한론에서는 나오지 않고 금궤요락에서만 볼 수 있는 특이한 경우로서 陶弘景은 麻豆大를 赤小豆의 1/3이고, 大豆의 1/6이라 하였다⁸⁾. 麻杏薤甘湯, 防己黃芪湯,

白虎加桂枝湯, 朮附湯 등 4개 처방이 여기에 속한다. 이것의 절단크기는 散劑의 粉末과 湯劑의 大豆大 중간이다. 복용법도 散劑를 충복하는 것과 탕제를 전탕하는 것의 절중으로 麻豆大의 약재를 물 1升半에 넣고 잠시 달여 1.2승 또는 1승을 만들고 1회에 모두 복용한다. 그리고 탕제가 1일분을 동시에 달여 여러 회 나누어 복용하는 것과는 달리 1회분씩 달인다는 것이 특징이다.

1錢匕를 복용하는 것은 甘藜, 大戟, 芫花로서 유독하고, 4錢匕 또는 5錢匕를 복용하는 것은 일반약이므로 여기에서도 독성이 있는 것은 복용량이 무독한것보다 적음을 알 수가 있다. 그러므로 錢匕로 표현한 약재가 方寸匕로 표현한 것보다는 소량임을 알 수가 있고, 錢匕를 錢上의 誤字로 보고 五銖錢의 한변으로 분말약을 쓰는 것으로 것이란 설은 타당성이 있다.

4. 가리척산의 용량추정

금계요략의 訶梨勒散은 氣利에 사용하는 것인데 訶梨勒은 訶子の 인도어이고, 설사를 그치게 하는 수렴약이다. 복용법은 잿불에서 구운 訶梨勒 10개를 잿불에 파묻어 굽고 가루내고 죽으로 만들어 단번에 복용한다. 그런데 가자 10개는 대략 50g이 되므로 1회에 복용하기는 지나치게 양이 많다. 中華人民共和國藥典國藥典에서는 訶子 1일분이 3~9g이므로 50g과는 많은 차이를 보이고 있으므로¹²⁾ 訶梨勒散의 용량은 원문에서 누락된 것으로 판단되며, 금계요략과 상한론의 散劑에서 복용량은 독성이 없는 경우 方寸匕가 일반적이므로, 가리척산의 1일 복용량은 方寸匕인 것으로 추정된다.

5. 용량이 부피로 표현된 약재

傷寒論에서 용량은 감초, 계지, 작약 등 무게단위인 兩으로 된 것과 대추, 도인, 부자, 지각, 치자, 행인 등 갯수로 된 것이 있다. 이외에 부피로 된 것으로 액체성은 苦酒, 꿀, 술, 人尿, 猪膽汁이 있고, 알갱이는 桃仁, 冬瓜子, 麥門冬, 半夏, 生梓白皮, 石膏, 阿膠, 五味子, 吳茱萸, 赤小豆, 杏仁, 豆豉가 있다.

金匱要略에서는 액체성으로 표현한 것에 꿀, 馬通汁, 白酒, 生薑汁, 生地黄汁, 漿水, 淸酒가 있고, 고체성으로 표현한 것에 甘李根白皮, 苦參, 瓜瓣, 瓜子, 葵子, 桃仁, 麻子仁, 麥門冬, 虵蟲, 百合, 半夏, 酸棗仁, 小麥, 豉, 五味子, 薏苡仁, 葶藶, 蠶蟲, 芍藥, 赤石脂, 赤小豆, 蟬蛻, 薤白, 杏仁이 있다. 고체성중 감이근백피, 고삼, 위경, 작약을 제외한 나머지는 모두 알갱이로 된 것임을 알 수가 있다.

이처럼 증경방에서는 액체와 알갱이로 된 약재는 용량을 부피로 표현하였는데 이런 까닭은 측정의 용이성때문인 것으로 추정된다. 그리고 산제는 알갱이보다도 가는 분말이므로 부피단위로 측정하는 것이 용이하다. 그러므로 산제를 측정하는 단위인 錢匕는 부피를 나타내었을 가능성이 높다.

6. 湯劑구성약재의 용량단위

仲景方の 湯劑에서 구성약재의 용량은 1兩 단위로 표현한 것이 대다수이다. 半兩 또는 그 이하로 표현한 것은 傷寒論에서는 麻黃升麻湯이외에 桂枝麻黃各半湯, 桂枝二麻黃一湯, 桂枝二越婢一湯, 柴胡桂枝湯과 柴胡加龍骨牡蠣湯, 柴胡加芒硝湯, 回逆湯, 回逆加入參湯, 茯苓回逆湯, 黃芩加半夏生薑湯, 小柴胡湯, 理中丸 등이다. 이중 계지마황각반탕, 계지이마

황일탕은 계지탕과 마황탕을 일정한 비율로 합방한 것이고, 계지이월비일탕은 계지탕과 월비탕을 일정한 비율로 합방한 것이며, 시호계지탕은 소시호탕과 계지탕을 각각 1/2씩 합방한 것이고, 시호가망초탕은 소시호탕의 1/3에 망초를 더한 것이며, 회역탕, 회역가인삼탕, 복령회역탕은 乾薑附子湯에 가미한 것이며, 황금가반하생강탕은 황금탕에 가미한 것이다. 그리고 소시호탕과 이중환에서 증상에 따라 구성약재를 증량한 경우 단위가 半兩이다. 그러므로 상한론의 경우 마황승마탕을 제외하고는 원방에서 半兩이 사용된 경우는 없음을 알 수가 있다. 그런데 마황승마탕도 표4.에서 보는 바와 같이 판본에 따라 처방내용과 용량이 매우 다르고, 千金方10)에서는 半兩이 사용되지 않았음을 알 수가 있다.

金匱要略에서는 麻杏薤甘湯의 마황과 의이인이 半兩이고, 小建中湯에서 황기를 1兩半 더한 黃芪建中湯, 小建中湯에서 腹滿者는 대추를 제거하고 茯苓을 1兩半 더하며, 白朮附子湯의 백출 1兩半, 外臺茯苓飲의 橘皮 2兩半, 升麻歸甲湯의 雄黃 半兩이므로, 마행의감탕과 백출부자탕과 승마별갑탕이외에는 원방에서 半兩이 사용된 경우가 없다.

이와같이 중경방에서 약의 용량을 나타내는 단위가 무게로는 1兩이 대부분이며 半兩을 사용한 경우는 원방에서 극히 일부인 까닭은, 1兩을 6~7g이고 半兩은 3~3.5g에 해당하므로, 1兩 6~7g이 실용적으로 측정가능한 최소단위이었기 때문으로 추정한다. 만일 錢匕가 무게단위이고 1/10兩으로 가정한다면 0.7g에 해당하여 실용화하기에는 어려웠을 것으로 추정된다.

이상에서 散劑를 측정하는 錢匕는 方寸匕보다 분량이 적고, 부피를 나타낸다고 추정된다. 그리고 五銖錢의 크기가 方寸匕와 비슷하므로 錢匕는 錢上의 誤字이며 五銖錢의 한변

으로 쓰는 것이란 설은 근거가 인정된다.

III. 結 論

상한론과 金匱要略에 수록된 처방에서 복용량을 표현하는 것중 錢匕의 의미가 부피인지 무게인지를 판단하기 위하여 탕제와 산제의 내용을 정리하여 복용량을 결정하는 공통된 기준을 도출하고, 다음과 같은 결과를 얻었다.

1. 散劑의 측정단위 4가지중 方寸匕, 대추크기, 달걀노른자크기가 모두 부피단위이다.
2. 方寸匕로 복용하는 것은 無毒하고 錢匕인 경우는 有毒하며, 方寸匕에서도 蜘蛛散은 독성이 있으므로 1/8만 복용하고, 錢匕에서도 광물성은 독성이 강하므로 식물성의 1/2을 복용한다.
3. 錢匕로 복용하는 湯劑나 丸劑에서 복용량은 독성이 강한 것은 1錢匕이고, 일반약은 4錢匕 또는 5錢匕이다.
4. 약제가 액체인 것과 작은 球型인 것은 측정단위가 부피인 升이었고, 粉末이나 麻豆大는 球型보다도 작다.
5. 湯劑에서 구성약재의 용량은 최소측정단위가 1兩이며 半兩은 麻黃升麻湯이외에는 增量하거나 加味하는 경우에만 일부 사용되었으므로 錢匕를 1/10兩으로 인정하기는 어렵다.

이상에서 散劑를 측정하는 方寸匕, 大棗大, 鷄子大黃은 단위가 부피이고, 독성이 있는 것은 용량이 적으며, 작은 球型의 약제는 부피

로 측정하므로, 錢匕는 부피를 측정하는 단위로서 錢上의 誤字이며 五銖錢의 한변으로 뜨는 것이란 설이 인정된다.

IV. 參考文獻

1. 김은하, 변성희, 상한론에 있어서의 도량형, 한방의 제문제, 전파과학사, 1998, 231-266, 서울.
2. 김인락, 계지탕의 기미 표준화 연구(1), 제3의학, 1997, 2(2), 297-313.
3. 김인락, 엄태원, 중경방의 반하용법, 한국본초의학회지, 2001, 4(1), 27-31.
4. 박성수, 엄태환, 한방처방해설, 현대한방강좌, 행림서원, 1977, 66, 서울.
5. 郭秀梅, 岡田研吉, “錢匕”當爲“錢上”辨, 醫古文知識, 1996, 43(1), 42-44.
6. 唐慎微編著, 重修政和經史證類備用本草, 臺北, 南天書局有限公司, 1976, 35, 90.
7. 中國中醫研究院, 金匱要略, 醫學研究社, 1983, 253, 光州.
8. 이인철 역, 돈의 세계사, 까치글방, 1998, 136, 서울.
9. www.firefox.postech.ac/tour/kongju/museum/relic3.html.
10. 陳亦人 주편, 傷寒論譯釋, 上海科學技術出版社, 1992, 上海.
11. 李克光 주편, 金匱要略譯釋, 上海科學技術出版社, 1993, 上海.
12. 國家藥典委員會 編, 中華人民共和國藥典 2000년판, 化學工業出版社, 2000, 146, 北京.

표1-1. 仲景方の 散劑중 1회 복용량이 方寸匕인 처방

	처방명	처방내용	1회복용량/ 1일회수	출전/ 복용방법
1	訶梨勒散	訶梨勒10개(煨)	방촌비	금/ 粥飲和,頓服.
2	鷄屎白散	鷄屎白	방촌비/?회	금/물6합
3	瓜蒌牡蠣散	栝樓根:牡蠣(熬)=1:1	방촌비/3회	금
4	葵子茯苓散	葵子1승 茯苓3兩	방촌비/3회	금/
5	『肘後』 獺肝散	獺肝1개 炙乾	방촌비/3회	금
6	當歸散	當歸:黃芩:芍藥:川芎:白朮 =16:16:16:8	방촌비/2회	금
7	當歸芍藥散	芍藥:澤瀉:川芎: 茯苓:白朮:當歸= 16:8:8(3):4:4:3	방촌비/3회	금/술
8	頭風摩散	大附子(炮):소금=1:1	방촌비	금/외용약
9	蚊蛤散	蚊蛤	방촌비/없슴	상,금/끓는물/ 회수없슴
10	半夏乾薑散	半夏:乾薑=1:1	방촌비/돈복	금/장수1승반/ 자취7합
11	百合滑石散	百合:滑石=1:2	방촌비/3회	금
12	燒禪散	禪	방촌비/ 3회	상
13	五苓散	白朮:茯苓:猪苓:桂枝: 澤瀉=3:3:3:2:5	방촌비/3회	상,금/ 쌀달인물

표1-2. 仲景方의 散劑중 1회 복용량이 方寸匕인 처방

	처방명	처방내용	복용량	출전,기타
14	王不留行散	王不留行(八月采): 蒴藋細葉(七月采): 桑東南根白皮(三月采): 甘草: 川椒(除目及閉口,去汗): 黃芩:乾薑:厚朴:芍藥:= 10:10:10:18:3:2:2:2:2	방촌비/ 회수없슴	금/소금창 :외용 대금창:내 복
15	薏苡附子 敗醬散	薏苡仁:附子:敗醬 = 10:2:5	방촌비/ 頓服	금/물2승 달여 1승
16	薏苡附子散	薏苡仁15兩 大附子(포)10개	방촌비/3회	금
17	茵陳五苓散	茵陳蒿말:五苓散 = 10:5	방촌비/3회	금
18	猪苓散	猪苓:茯苓:白朮 = 1:1:1	방촌비/3회	상,금/물
19	赤小豆當歸散	赤小豆3승, 當歸3兩	방촌비/3회	금
20	枳實芍藥散	枳實(燒令黑,勿太過):芍藥 = 1:1	방촌비/3회	금
21	蜘蛛散	蜘蛛14개(熬焦) 桂枝半兩	1/8방촌비/ 2회	금/ 飲和服
22	硝石礬石散	硝石:礬石(燒) = 1:1	방촌비/3회	금
23	土瓜根散	土瓜根:芍藥:桂枝:蟪蟲 = 1:1:1:1	방촌비/3회	금/술
24	浦灰散	蒲灰:滑石 = 7:3	방촌비/3회	금
25	滑石白魚散	滑石:亂髮(燒):白魚 = 1:1:1	방촌비/3회	금
26	回逆散	甘草:枳實:芍藥:柴胡 = 1:1:1:1	방촌비/ 3회	상/백음
27	侯氏黑散	菊花:白朮:防風:桔梗:黃芩: 細辛:茯苓:牡蠣:人蔘:礬石, 當歸,乾薑,芍藥,桂枝 = 40:10:10:8:5:각3	방촌비/1회	금

표2. 仲景方の 散劑중 1회 服用兩이 錢上인 처방

	처방명	처방내용	1회복용량/ 1일회수	출전/ 복용방법
1	瓜蒂散	瓜蒂(熬黃):赤小豆=1:1	1錢上/ 토할 때 까지	상, 金/香豉一合, 水七合煮取汁,
2	『外臺』 桔梗白散	桔梗:貝母:巴豆 (去皮,熬,研如脂)=3:3:1	半錢上/1회	金/ 弱者는 半減
3	『外臺』 白朮散	白朮:川芎:蜀椒(去汗): 牡蠣=4:4:3:2	1錢上/4회	金
4	天雄散	天雄(炮):龍骨:桂枝:白朮=3:3:6:8	半錢上/3회	金
5	蜀漆散	蜀漆:雲母:龍骨=1:1:1	半錢上/	金/학질발할 때

표3. 仲景方の 湯劑와 丸劑 중 1회 복용량이 錢上으로 수록된 처방

	처방명	약	크기	약	물	출전
1	大陷胸湯	甘遂1전상 大黃6양, 芒硝1승	末(甘遂)	1錢上	大黃6승/2승 芒硝/甘遂末/2	상
2	大陷胸丸	2) 甘遂末 1전상 1) 大黃반근, 葶藶子반근(熬)搗篩, 芒硝반승 杏仁반승(去皮尖,熬黑) 함께간다 彈丸一枚,	末(甘遂)	1錢上	大陷胸丸, 꿀2합, 물2승/ 1, 甘遂末	상
3	十棗湯	堯花(熬), 甘遂, 大戟 동량	散	1錢上	큰대추 10개 1/0.8	상, 金/弱 者는 半減
4	麻杏薏甘湯	麻黃8, 甘草1, 薏苡8, 杏仁10개	剉 麻豆大	4錢上	1.5/1.2/1	금2-2 1
5	防己黃芪湯	防己1, 甘草0.5, 白朮0.75, 黃芪1.25	剉 麻豆大	5錢/생 강4쪽, 대추 1	1.5/1.2/1	금2-2 2
5-1	防己黃芪湯 (千金方)	漢防己4, 甘草2, 白朮3, 黃芪5	剉 麻豆大	5錢/생 강3, 대추1 2	1.5/1.2/1	금2-2 2
6	白虎加桂枝 湯	石膏1근, 粳米2합, 桂枝3양, 甘草2양, 知母6양	剉	5錢上	1.5/1.2/1	금4-4
7	『近效方』 朮附湯	白朮2양, 甘草1양, 附子1개반,	剉	5錢/생 강5쪽, 대추 1	1.5/1.0/1	금5- 近效 方

표4. 麻黃升麻湯의 판본별 처방내용과 용량

	傷寒論	金匱玉函經	千金方	千金翼方	外臺秘要
麻黃	2兩半	1兩6銖	3兩	2兩半	2兩半
升麻	1兩1分	1兩6銖	2兩	1兩1分	1兩1分
當歸	1兩1分	1兩1分	2兩	1兩1分	1兩1分
知母	18銖	18銖	3兩	18銖	18銖
黃芩	18銖	18銖	3兩	18銖	18銖
萎蕤	18銖 (一作菖蒲)	6銖	3兩	18銖 (一作菖蒲)	菖蒲 18銖
芍藥	6銖	6銖	2兩	6銖	6銖
天門冬	6銖	麥門冬6銖	2兩	麥門冬6銖	
桂枝	6銖	6銖	2兩	6銖	6銖
茯苓	6銖	6銖	2兩	6銖	6銖
甘草	6銖	6銖	2兩	6銖	6銖
石膏	6銖	6銖	2兩	6銖	6銖
白朮	6銖	6銖	2兩	6銖	6銖
乾薑	6銖	6銖	2兩	6銖	6銖